

ການຈຳແນກ

ສັດປ່າ

ທີ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍເປັນປະຈຳ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ (ສປປ ລາວ • ມຽນມາ • ໄທ)

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network



ການຈຳແນກສັດປ່າ ທີ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍເປັນປະຈຳ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສາມໝູ່ຮຸນຄຳ

ສປປ ລາວ · ມຽນມາ · ໄທ

TRAFFIC

the wildlife trade monitoring network

WWW.TRAFFIC.ORG

TRAFFIC ແມ່ນອົງການຊັ້ນນຳທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໂດຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ພືດປ່າຫົວໂລກ ເຊິ່ງຢູ່ໃນບໍລິບົດຂອງທັງການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນານາພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການຜະລິດຄືນໃໝ່ຂອງເນື້ອໃນທີ່ປະກົດໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຈັດພິມ.

ການອອກແບບສະຖານທີ່ທາງພູມິສາດໃນການຈັດພິມສະບັບນີ້ ແລະ ການສະແດງເນື້ອໃນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໜຶ່ງຈາກສ່ວນຂອງ TRAFFIC ຫຼື ອົງການສະໜັບສະໜູນຂອງຕົນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບສະຖານະທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ອານາເຂດ ຫຼື ບໍລິເວນ ຫຼື ໃນອຳນາດຂອງຕົນ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບການກຳນົດຊາຍແດນ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງຕົນ.

© TRAFFIC 2020. ລິຂະສິດຂອງເນື້ອໃນທີ່ຖືກຈັດພິມໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນຂອງ TRAFFIC.

ການອ້າງອີງທີ່ແນະນຳ: Beastall, C.A. and Chng, S.C.L. (2020). *Identification of Commonly Traded Wildlife with a focus on the Golden Triangle (Lao PDR, Myanmar and Thailand)*. TRAFFIC, Southeast Asia Regional Office, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືນີ້

ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍຈຳແນກສາຍພັນສັດປ່າ ທີ່ຄົນພົບວ່າຄ້າ-ຂາຍເປັນປະຈຳຢູ່ສາມຫຼ່ຽມ ຄ້າ (ສປປ ລາວ, ນຽນມາ ແລະ ໄທ). ມັນຄືການອັບເດດຂອງ ເອກະສານການຈຳແນກຊະນິດພັນສັດປ່າທີ່ ຄ້າຂາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊິ່ງຜະລິດສຳລັບເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສັດປ່າຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN-WEN) ລະຫວ່າງປີ 2008 ແລະ 2013. ສະບັບນີ້ ແມ່ນຖືກຜະລິດຂຶ້ນໃນປີ 2020.

ຄູ່ມືນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ສຳຄັນໃນການຈຳແນກສາຍພັນ ຫຼື ອານຸກົມວິທານ ແລະ ສິ່ງທີ່ຖືກ ຄ້າຂາຍ. ສຳລັບແຕ່ລະສາຍພັນ ຫຼື ກຸ່ມສາຍພັນ ຊື່ທາງວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງຊື່ສາມັນໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນພາສາອັງກິດ.

ແຕ່ລະໜ້າສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊີຂອງ CITES ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນສາມາດໄດ້ມາຈາກ <https://speciesplus.net> ໂດຍໃຊ້ຊື່ທາງວິທະຍາສາດ ຫຼື ຊື່ພາສາອັງກິດເພື່ອຄົ້ນຫາ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ CITES ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ສຳລັບສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງ CITES ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ອົງການວິທະຍາສາດ ຂອງທ່ານແມ່ນຖືກລວມເວົ້າໃນໜ້າ VI ຫຼື ທີ່ www.cites.org.

ກະລຸນາກວດເບິ່ງນິຕິກຳແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ເພື່ອກຳນົດວ່າຊະນິດໃດທີ່ຖືກປົກປ້ອງຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະເມີນສາຍພັນໂດຍບັນຊີແດງຂອງ IUCN ແມ່ນສາມາດເບິ່ງຈາກ www.iucnredlist.org ໂດຍຄົ້ນຫາຊື່ວິທະຍາສາດ ຫຼື ຊື່ພາສາອັງກິດ.

ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍັງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ພາກສ່ວນ “ຄ້າຂາຍເປັນ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ສາຍພັນຕ່າງໆຖືກຄ້າຂາຍ ຕາມ ນິຍາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ແບບຍັງມີຊີວິດ: ເປັນສັດລ້ຽງ, ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຟາມສັດລ້ຽງ

ອາຫານ : ກິນເພື່ອບຳລຸງລ້ຽງ ຫຼື ເປັນອາຫານແຊບນິວ

ເຄື່ອງສະສົມ : ເປັນລາງວັນ, ການແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງຕິບແຕ່ງອື່ນໆ

ເຄື່ອງປະດັບ : ມັກສວມໃສ່ ເຊັ່ນ ອັນຍະມະນີ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງຂອງທາງສາສະໜາ (ເຊັ່ນ ເຄື່ອງລາງ) ອື່ນໆ

ຢາ : ບໍລິໂພກເພື່ອຄຸນປະໂຫຍດດ້ານການຢາ

ອະທິບາຍຄຳສັບ

ອອງເຕົາ : ອອງຂອງເຕົາທະເລ ຫຼື ເຕົານ້ຳຈືດ

ລຸ່ມອອງເຕົາ : ເປົກລຸ່ມຂອງເຕົາທະເລ ຫຼື ເຕົານ້ຳຈືດ

ແຜ່ນກະດູກ : ແຜ່ນກະດູກ ຫຼື ເກັດຂອງເຕົາທະເລ, ເຕົານ້ຳຈືດ, ທີ່ຢູ່ເທິງເປົກ ຫຼື ຫົວ ແລະ ຂາ

ເກັດຢູ່ຕີນຄໍ : ເກັດຮຽວຢູ່ໃຈກາງເທິງຫົວ (ບໍ່ແມ່ນທຸກຊະນິດ)

ເນື້ອໃນ

- IV ບັນຊີແດງຂອງ CITES ແລະ IUCN
- VI ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງ CITES
- VII ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບອະນຸຍາດ CITES
- VIII ການກວດຄຸ້ມການອະນຸຍາດແບບສັງເກດ
- XI ເຕັກນິກການລັກລອບພາສີທີ່ພົບເລື້ອຍ

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 2 | <i>Capricornis</i> spp. | ຊະນິດພັນເຍືອງ |
| 4 | <i>Saiga tatarica</i>
<i>Saiga borealis</i> | ລະມັ່ງໄຊກາ |
| 6 | <i>Cervidae</i> spp. | ເຂົາກວາງ |
| 8 | <i>Wild Felidae</i> spp. | ຊະນິດພັນແນວປ່າ |
| 12 | <i>Lutrinae</i> spp. | ນາກນ້ຳແຖວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ |
| 14 | <i>Helarctos malayanus</i>
<i>Ursus thibetanus</i> | ໝີແຖວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ |
| 16 | <i>Rhinocerotidae</i> spp. | ຊະນິດພັນແຮດ |
| 18 | <i>Pholidota</i> spp. | ຊະນິດພັນລິ້ນ |
| 20 | <i>Primate</i> spp. | ທະນີ ແລະ ລົງ |
| 22 | <i>Elephantidae</i> spp. | ຊະນິດພັນຊ້າງ |

ນົກ

- | | | |
|----|--|--|
| 28 | <i>Bucerotidae</i> spp. | ຊະນິດພັນຂອງນົກກົກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ |
| 30 | <i>Falconiformes</i> spp.
<i>Accipitriformes</i> spp. | ຊະນິດພັນຂອງນົກລ່າເຍື້ອ |
| 32 | <i>Strigiformes</i> spp. | ຊະນິດພັນຂອງນົກເຄົ້າ |
| 34 | <i>Psittaciformes</i> spp. | ຊະນິດພັນຂອງນົກແກ້ວ |
| 36 | <i>Gracula religiosa</i> | ນົກສາລິກາ |
| 37 | <i>Kittacincla malabaricus</i> | ນົກແຕ້ນປູນ |

ສັດເລືອຄານ

40	<i>Gekko gekko</i>	ກັບໄກ້
42	Varanidae spp.	ຊະນິດພັນເຫັຍ
44	<i>Ophiophagus, Naja</i> spp.	ຊະນິດພັນຂອງງູເທົ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
46	Pythonidae spp.	ຊະນິດພັນຂອງງູເຫຼືອນ
48	Cheloniidae	ເຕົ່າທະເລ
	Dermochelyidae	
50	<i>Batagur</i> spp.	ເຕົ່າປາກແມ່ນ້ຳ
52	<i>Geoclemys hamiltonii</i>	ເຕົ່າບຶງຈູດ
54	<i>Heosemys grandis</i>	ເຕົ່າຫວາຍ
56	<i>Cuora</i> spp.	ຊະນິດພັນເຕົ່າຄຳ
58	<i>Platysternon megacephalum</i>	ເຕົ່າກຸຍ
60	Testudinidae spp.	ຊະນິດພັນຂອງເຕົ່ານ້ຳຈືດ
62	<i>Geochelone elegans</i>	ເຕົ່າດາວ
	<i>Geochelone platynota</i>	
	<i>Astrochelys radiata</i>	
64	<i>Indotestudo elongata</i>	ເຕົ່າເພັກ
66	<i>Manouria emys</i>	ເຕົ່າຫົກ
	<i>Manouria impressa</i>	ເຕົ່າເຄືອຍ
68	<i>Amyda cartilaginea</i>	ເຕົ່າອອງອ່ອນ
	<i>Dogania subplana</i>	
	<i>Pelodiscus sinensis</i>	

ບັນຊີແດງຂອງ CITES ແລະ IUCN

ສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ*

ສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ (ສິນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ ຈະສູນພັນລະຫວ່າງຊາດ) ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ (ລັດສະມາຊິກ).

ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຄ້າສາກົນໃນດ້ານຊະນິດສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ (ຫລື ສ່ວນ ແລະ ອະນຸພັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ມາຈາກສ່ວນຂອງພືດ ແລະ ສັດເຫລົ່ານັ້ນ) ບໍ່ໄດ້ຄຸກຄາມການຢູ່ລອດ ຂອງພວກມັນ.

ສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ເຮັດວຽກໂດຍການຄຸ້ມຄອງການຄ້າສາກົນໃນດ້ານຊະນິດສັດ ພືດບາງຊະນິດ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ.

ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ການຂົນສົ່ງອອກຄືນ ແລະ ການຂົນສົ່ງຊະນິດສັດ ພືດທາງທະເລ ຫລາຍກວ່າ 35,000 ຊະນິດ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍສິນທິສັນຍາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຜ່ານລະບົບການອະນຸຍາດ. ສັດ ແລະ ພືດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ທີ່ປະກົດຢູ່ໜຶ່ງໃນເອກະສານຄັດຕິດ 3 ສະບັບ ໝາຍເຖິງວ່າ ການຄ້າສັດຈະຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຜ່ານລະບົບການອະນຸຍາດມາດຕະຖານ:

ເອກະສານຄັດຕິດ I ຈະລວມເອົາສັດຊະນິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູນພັນ. ການຄ້າສັດຊະນິດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີຍົກເວັ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ເອກະສານຄັດຕິດ II ຈະລວມເອົາສັດທີ່ການຄ້າບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ເຊິ່ງສາມາດຄຸກຄາມການຢູ່ລອດຂອງສັດ. ສັດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸກຄາມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໃນປະຈຸບັນ.

ເອກະສານຄັດຕິດ III ຈະລວມເອົາຊະນິດສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງປະເທດໂດຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດສະມາຊິກອື່ນ ຊ່ວຍຄວບຄຸມການຄ້າ.

ຊະນິດສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ສາມາດນຳເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກພຽງແຕ່ (ຫລື ສົ່ງອອກຄືນ) ນອກລັດສະມາຊິກ ຖ້າມີເອກະສານທີ່ເໝາະສົມ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ເອກະສານກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ຈຸດກວດ ໃນເຂດອອກ ຫລື ເຂົ້າປະເທດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດອາດຈະເຂັ້ມງວດຫລາຍກວ່າ ແລະ ເປັນກົດໝາຍ ທີ່ຄວນຈະນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນສາມາດເບິ່ງຢູ່ໃນເວັບໄຊ www.cites.org

* ສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ກຳນົດວ່າ ຂັ້ນຕອນໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າສາກົນໃນດ້ານສັດ ແລະ ພືດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ.



ບັນຊີແດງ** ຂອງຊະນິດສັດໃກ້ສູນພັນຂອງອົງການ IUCN

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1964, ບັນຊີແດງຂອງອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດສາກົນ (IUCN) ແມ່ນແຫວງຂໍ້ມູນທີ່ຄອບຄຸມສາກົນໃນດ້ານສະພາບການອະນຸລັກສາກົນຂອງສັດ, ເຊື້ອລາ ແລະ ພັນພືດ.

ບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການອະນຸລັກ, ການຈັດຊັ້ນໝວດໝູ່ຂອງພືດສັດ ແລະ ຂໍ້ມູນການແຈກຍາຍຂອງສັດ ແລະ ພືດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ຊະນິດ ແລະ ນາດຖານແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກຳນົດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນພັນ.

ຊະນິດສັດທີ່ຂຶ້ນບັນຊີ CR (ສູນພັນຂຶ້ນຮຸນແຮງ), EN (ສູນພັນ) ແລະ VU (ມີຄວາມສ່ຽງ) ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າໃນການສູນພັນ ຫລາຍກວ່າ ສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ຄື NT (ໃກ້ຖືກຄຸກຄາມ) ຫລື LC (ມີຄວາມກ້າງວິນໜ້ອຍ).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢູ່ເວັບໄຊ www.iucnredlist.org

** ບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN ກຳນົດສະຖານະທາງຊີວະວິທະຍາຂອງສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ.



ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງ CITES

ສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ເຮັດວຽກໂດຍການຄຸ້ມຄອງການຄ້າສາກົນໃນດ້ານຊະນິດສັດ ພຶດບາງຊະນິດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. ທຸກການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ການຂົນສົ່ງອອກຄືນ ແລະ ການຂົນສົ່ງຊະນິດສັດ ພຶດບາງທະເລທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍສິນທິສັນຍາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຜ່ານລະບົບການອະນຸຍາດ.

ແຕ່ລະປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາຂອງສິນທິສັນຍາໄຊເຕັສ ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍອົງກອນຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານລະບົບການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍກວ່າເພື່ອແນະນຳອົງກອນເຫລົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານການຄ້າຕໍ່ກັບສະຖານະຂອງຊະນິດສັດ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງ

ປັບປຸງລ້າສຸດ: 31/07/18

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ທ່ານ. ສຸຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ

ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕູ້ໄປສະນີ 2932

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ : +856 (21) 21 50 00

ໂທລະສານ : +856 (21) 21 74 83

ອີເມວ : ssayakoummame@gmail.com

cc : ckeophouvong@yahoo.com

ອົງການວິທະຍາສາດ

ປັບປຸງລ້າສຸດ: 11/10/19

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ດຣ. ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາຣາ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊີ,

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ

ຕູ້ໄປສະນີ 2279

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ : +856 (21) 73 22 07

ໂທລະສານ : +856 (21) 74 06 30


ອີເມວ : sourioudong@yahoo.co.uk



ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບອະນຸຍາດ CITES*

ແຕ່ລະການຈັດສົ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸຍາດທາງ ໄຊເຕັສ

ເອກະສານຄັດຕິດ I : ໃບອະນຸຍາດການສົ່ງອອກ - ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງອອກຄືນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ
ເອກະສານຄັດຕິດ II : ໃບອະນຸຍາດການສົ່ງອອກ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງອອກຄືນ
ເອກະສານຄັດຕິດ III : ໃບອະນຸຍາດການສົ່ງອອກ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນແຫວ່ງທຳມາ



ກວດເບິ່ງວ່າ ຊະນິດສັດ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມແບບຟອມຄວບຄຸມອື່ນໆໃດໜຶ່ງ

* ປັບຈາກ ອົງການສົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ການນາດາ, 2003
** ກໍລະນີ (ບໍ່ແມ່ນປະເທດທັງໝົດ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ກາປະທັບໄຊເຕັສ)



ການກວດຄົ້ນການອະນຸຍາດແບບສັງກວງ

ໃບອະນຸຍາດປອມ - ໃບອະນຸຍາດຫລອກລວງ

- 1 ເຈ້ຍຈະເບິ່ງຜິດປົກກະຕິ**
ໂຕໜັງສືໜາ, ເນື້ອໃນ ແລະ/ຫລື ສີຜິດປົກກະຕິ
- 2 ກາປະທັບ, ກາຈ້າ ຫລື ກາຄວາມປອດໄພ**
ສຳເນົາບໍ່ດີ ຫລື ບໍ່ລະອຽດ (ໂດຍສ່ວນຫຼາຍອີງການຄຸ້ມຄອງຂອງປະເທດຂອງທ່ານຈະມີຊຸດ
ຕົວຢ່າງໃບອະນຸຍາດ ຈາກລັດສະມາຊິກສິນທິສັນຍາໄຊເດັສ)

ໃບອະນຸຍາດປອມແປງ - ໃບອະນຸຍາດຂອງແທ້ ທີ່ມີການດັບແປງ

- 1 ໃບອະນຸຍາດແມ່ນເອກະສານສຳເນົາ**
ໂດຍທົ່ວໄປ ໃບອະນຸຍາດຕົ້ນສະບັບສາມາດຖືກນຳໃຊ້ (ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ໃບສຳເນົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ,
ເອກະສານເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຕົ້ນສະບັບ ແລະ ກາປະທັບຂອງອົງກອນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອ
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບອະນຸຍາດ)
- 2 ພົມຜິດປົກກະຕິ**
ນ້ຳໝຶກຈະມີສີຕ່າງກັນ, ປະເພດລັກສະນະຕ່າງກັນ ທີ່ໃຊ້ໃນເອກະສານດຽວກັນ
- 3 ມີຈຸດນ້ຳໝຶກ**
ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນ້ຳຢາລືບໄດ້ຖືກໃຊ້ ເພື່ອປ່ຽນແປງໃບອະນຸຍາດ - ງ່າຍ ທີ່ຈະເຫັນ ຖ້າ
ທ່ານຖືໃບອະນຸຍາດຂຶ້ນຫາແສງໄຟ
- 4 ໃບອະນຸຍາດມີການເພີ່ມເຕີມ ຫລື ຮອຍລືບ**
ໃບອະນຸຍາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ (ເວັ້ນແຕ່ ອົງການຄຸ້ມຄອງຮັບຮອງການປ່ຽນແປງ
ດັ່ງກ່າວເປັນຂອງແທ້)

ໃບອະນຸຍາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

- 1 ມີໝົດກຳນົດ**
ນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດທີ່ໝົດກຳນົດ. ສຳລັບການສົ່ງອອກ ຫລື ການຂົນສົ່ງອອກຄືນ, ໄລຍະລະຫວ່າງມີ
ໝົດກຳນົດ ແລະ ມີອອກໃບອະນຸຍາດ ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນ ສຳລັບໃບອະນຸຍາດນຳ
ເຂົ້າ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບຕົ້ນ
- 2 ເນື້ອໃນທີ່ກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຂົນສົ່ງ**
ລາຍລະອຽດຕົວຢ່າງ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຢ່າງຕົວຈິງ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນການຂົນສົ່ງ (ປະເພດສັດພືດຕ່າງ
ກັນ, ຈຳນວນຕ່າງກັນ ຫລື ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ອະນຸພັນຕ່າງກັນ)



ໃບອະນຸຍາດປອມ ແມ່ນຖືກພົບໂດຍທົ່ວໄປ ໃນສະພາບການຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການຂົນສົ່ງອອກຄົນ

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ວ່າຈະຖືກສະແດງໃນກ່ອງ 12 ຢ່າງຊັດເຈນ (ໄປເບິ່ງໜ້າ X):

- 1 ປະເທດຕົ້ນທາງ
- 2 ຈຳນວນໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງອອກ
- 3 ມີອອກໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງອອກ

ການຂົນສົ່ງອອກຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນ

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໃນກ່ອງ 12a ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ໄປເບິ່ງໜ້າ X):

- 1 ປະເທດຂົນສົ່ງອອກຄົນລ້າສຸດ
- 2 ຈຳນວນໃບອະນຸຍາດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງອອກຄົນ
- 3 ມີອອກໃບອະນຸຍາດ
- 4 ກວດເບິ່ງວ່າ ກ່ອງ 12 ມີຄືບໍ່

ການຂົນຖ່າຍທາງເຮືອ

- 1 ກວດເບິ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ ທີ່ສະແດງໃນໃບອະນຸຍາດ ແມ່ນອັນດຽວກັນ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນເອກະສານຂົນສົ່ງ
- 2 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ກວດເບິ່ງວ່າ ເນື້ອໃນການຂົນສົ່ງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດ

ການສະແດງໂຮງລະຄອນສັດ ຫລື ການເດີນທາງ ເພື່ອດຳເນີນການສະແດງ

- 1 ສັດທຸກໆ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງເພື່ອສະແດງຂອງຕົນ ຫລື ໃບອະນຸຍາດໄຊເຕັສ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນ
- 2 ກວດເບິ່ງວ່າ ໝາຍ/ລາຍ/ສະຫລາກຂອງສັດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ ຕາມທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນໃບຢັ້ງຢືນ
- 3 ກວດເບິ່ງວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕາມເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ສຳລັບສັດແຕ່ລະໂຕ
- 4 ໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງ ເພື່ອດຳເນີນການໄປສະແດງ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ 3 ປີ - ບໍ່ຕ້ອງເກັບຮັກສາຕົ້ນສະບັບໄວ້ ຫລັງຈາກກວດກາ. ໃບຢັ້ງຢືນຈະມີໃບອະນຸຍາດສືບຕໍ່ ດ້ວຍກ່ອງທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຂົນສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ

ການຄ້າກັບປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍສັນທິສັນຍາໄຊເຕັສ

- 1 ສິນຄ້າຕ້ອງມີເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມີເນື້ອໃນດຽວກັນ ກັບໃບອະນຸຍາດ ໄຊເຕັສ



 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA		PERMIT/CERTIFICATE No. ☐ EXPORT ☐ RE-EXPORT ☐ IMPORT ☐ OTHER:		Original 2. Valid until	
		3. Importer (name and address) 3a. Country of import		4. Exporter/re-exporter (name, address and country) Signature of the applicant	
5. Special conditions <i>For live animals, this permit or certificate is only valid if the transport conditions conform to the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations</i>		6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority			
5a. Purpose of the transaction (see reverse)		5b. Security stamp no.			
7./8. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant		9. Description of specimens including identifying marks or numbers (age/sex if live)		10. Appendix no. and source (see reverse)	11. Quantity (including unit)
12. Country of origin *		Permit no.		Date	
12a. Country of last re-export		Certificate no.		Date	
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***					
7./8.		9.		11a.	
12. Country of origin *		Permit no.		Date	
12a. Country of last re-export		Certificate no.		Date	
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***					
7./8.		9.		11a.	
12. Country of origin *		Permit no.		Date	
12a. Country of last re-export		Certificate no.		Date	
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***					
7./8.		9.		11a.	
12. Country of origin *		Permit no.		Date	
12a. Country of last re-export		Certificate no.		Date	
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***					
* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of re-export) ** Only for specimens of Appendix I species bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes *** For pre-convention specimens					
13. This permit/certificate is issued by: _____ Place Date Security stamp, signature and official seal					
14. Export endorsement		15. Bill of Lading/Air waybill number			
Block	Quantity				
A					
B					
C					
D					
Port of export		Date		Signature Official stamp and title	

CITES PERMIT/CERTIFICATE No.




ເຕັກນິກການລັກລອບພາສີທີ່ພົບເລື້ອຍ



ເຊື່ອງໄວ້ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ

ເສື້ອກັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງເພື່ອລັກລອບໂຂ່ນິກ (ເບື້ອງຊ້າຍ); ປາທີ່ຖືກລັກລອບພາຍໃຕ້ເສື້ອຜ້າ (ເບື້ອງຂວາ)



ເຊື່ອງໃນກະເບົາ

ງາຊ້າງທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນກະເບົາ (ເບື້ອງຊ້າຍ); ການສ່ອງໄຟຟ້າເຕົ້າໃນກະເບົາ (ເບື້ອງຂວາ)



ເຊື່ອງໄວ້ໃນຍານພາຫະນະ

ລົນແບບມີຊີວິດທີ່ຖືກເຊື່ອງຫຼັງລົດບັນທຸກສິນຄ້າ (ເບື້ອງຂວາ); ນົກທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ເທິງຢາງລົດເມ (ເບື້ອງຂວາ)



ເຕັກນິກການລັກລອບພາສີທີ່ພົບເລື້ອຍ (II)



ເຊື່ອງຢູ່ໃນກະທູ້ ແລະ ຂອງຫໍ່

ຄວາມພະຍາຍາມລັກລອບເອົາກັບໄກ້ເຂົ້າໃສ່ໃນປັ້ນ (ຊ້າຍ); ງູເຫຼົ່າ ທີ່ປິດບັງໄວ້ໃນທໍ່ພາດສະຕິກ (ເບື້ອງຂວາ)



ແລນອິດສະຕາລີ ພົບເຫັນເຊື່ອງໄວ້ໃນປັ້ນ (ເບື້ອງຊ້າຍ); ເຕົາແລະ ແລນ ຈຳນວນ 50 ໂຕທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນປັ້ນດາທ່ອນເຄື່ອງຫຼິ້ນ (ຂວາ)

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

<i>Capricornis</i> spp.	2	ຊະນິດພັນເຍືອງ
<i>Saiga tatarica</i>	4	ລະມັງໄຊກາ
<i>Saiga borealis</i>		
<i>Cervidae</i> spp.	6	ເຂົາກວາງ
Wild <i>Felidae</i> spp.	8	ຊະນິດພັນແນວປ່າ
<i>Lutrinae</i> spp.	12	ນາກນ້ຳແຖວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
<i>Helarctos malayanus</i>	14	ໝີ່ແຖວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
<i>Ursus thibetanus</i>		
<i>Rhinocerotidae</i> spp.	16	ຊະນິດພັນແຮດ
<i>Pholidota</i> spp.	18	ຊະນິດພັນລິ້ນ
<i>Primate</i> spp.	20	ທະນີ ແລະ ລີງ
<i>Elephantidae</i> spp.	22	ຊະນິດພັນຊ້າງ



ຊະນິດພັນເຍືອງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Capricornis</i> spp.	ຊື່ສາມັນ Serow spp.	📍 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ມາເລເຊຍ; ມຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
---	------------------------	--

ບັນຊີທັງໝົດ 1 ຂອງ CITES

ນອກຈາກ *Capricornis crispus* (ເຍືອງຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ *Capricornis swinhoei* (ເຍືອງເກາະພິດຊາ) ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກລົງບັນຊີ

ບັນຊີ

I

Capricornis sumatraensis
ເຍືອງເກາະສຸມາຕຣາ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

ຕ່ອມທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນລຸ່ມຕາແຕ່ລະໜ່ວຍ



ຕ່ອມ

ບັນຊີ 1 ຂອງ CITES:

- *Capricornis milneedwardsii* (ເຍືອງຈິນ)
- *Capricornis rubidus* (ເຍືອງແດງ)
- *Capricornis sumatraensis* (ເຍືອງເກາະສຸມາຕຣາ)
- *Capricornis thar* (ເຍືອງຮິນາໄລ)



ຊະນິດພັນເຍືອງໆ

- 1 ນໍ້າທັງໝົດ
- 2 ຫົວ
- 3 ນໍ້າມັນທີ່ເອົາມາຈາກຫົວ ແລະ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ
- 4 ໝັງ ແລະ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ

1



2



4



3



ລະມັງໄຊກາ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Saiga tatarica</i> <i>Saiga borealis</i>	ຊື່ສາມັນ Saiga Antelope	📍 ກາຊັກສະຖານ; ນິງເກິນ; ສະຫະພັນ ຮັດເຊຍ; ຕວັກເລນິນສະຖານ; ອຸດ ສະເລກິດສະຖານ
--	----------------------------	---

ບັນຊີ II ຂອງ CITES

ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າໃນລະດັບສາກົນແມ່ນບໍ່ຖືກອະນຸຍາດ



ບັນຊີ
II *Saiga tatarica*
ລະມັງໄຊກາ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

ຕົວຜູ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີນ້ຳໜັກ ແລະ ນ້ຳໜັກນີ້ແມ່ນ:

- ກົງໜ້ອຍໜຶ່ງ
- ໄສໆ
- ມີສີເຫຼືອງນ້ຳດານຄ້າຍຂີ້ເຜັງອ່ອນໆ
- ມີຖານເຂົ້າທີ່ແຂງ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ລະມັ່ງໄຊກາ

- 1 ການຂຸດນໍ້
- 2, 7 ຜະລິດຕະພັນຈາກນໍ້
- 3 ນໍ້າເຢັນທີ່ມີນໍ້
- 4 ອັນຍະນະນີທີ່ເຮັດຈາກນໍ້ ແລະ ເບກຕິກ
- 5 ອັນຍະນະນີທີ່ເຮັດຈາກນໍ້
- 6 ນໍ້ທັງໝົດ

ລະມັ່ງໄຊກາ

羚羊

Líng yáng

1



2



3



6



7




4



5



ເຂົ້າກວາງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Cervidae spp.		ຊື່ສາມັນ Deer Antlers	
ບັນຊີ CITES ແບ່ງ ແຍກຄອກແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ*	<i>Muntiacus</i> spp. ສາຍພັນຟານ	ບັນຊີ CITES ແບ່ງ ແຍກຄອກແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ**	<i>Axis porcinus</i> ກວາງຊາຍ
*ບັນຊີ I ຂອງ CITES: <i>Muntiacus crinifrons</i> (ຈາກຈີນ ແລະ ນຽນມາ) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (ຈາກຫວຽດນາມ) ສາຍພັນອື່ນໆທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີ CITES		**ບັນຊີ I ຂອງ CITES: <i>Axis porcinus annamiticus</i> (ຈາກຫວຽດນາມ) ສາຍພັນອື່ນໆທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີ CITES	
1 ປາຍເຂົ້າກວາງ  ຄວາມຍາວຂອງເຂົ້າ: 10 – 15 ຊມ ເສັ້ນຮອບວົງ: < 8.5 ຊມ		3 ປາຍເຂົ້າກວາງ  ຄວາມຍາວຂອງເຂົ້າ = 92 ຊມ ເສັ້ນຮອບວົງ = 14 ຊມ	
 ປາກົດສະຖານຫາອິນໂດເນເຊຍ, ເໜືອຫາຈີນ		 ບັງກລາເທດ; ກຳປູເຈຍ; ຈີນ; ອິນເດຍ; ນຽນມາ; ເນປານ; ປາກົດສະຖານ; ໄທ	
 ຈີນ; ຍີ່ປຸ່ນ; ສະຫະພັນຮັດເຊຍ; ໄຕໂທວິນ; ຫວຽດນາມ			

- ເຂົ້າສິ້ນງຸຂະຫຍາຍອອກຈາກສ່ວນກະດູກຍາວຍື່ນອອກມາແລະ ຖືກປັກຄຸມດ້ວຍຂີ້ນ
- ຄວາມຍາວຈາກກະໂຫຼກຫາກົກເຂົ້າ: ບໍ່ກ່າຍ 6.7 ຊມ

- ເຂົ້າຂະຫຍາຍອອກຈາກສ່ວນກະດູກສັນຍື່ນອອກມາ ແລະ ຖືກປັກຄຸມດ້ວຍຂີ້ນ
- ງ່າມທີ່ສາມນ້ອຍໆໃນກົກເຂົ້າຍື່ນອອກມາ
- ເປັນຄືສ້ອມທີ່ປາຍເຂົ້າ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ເຄື່ອງສະສິນ · ຢາ

ເຂົ້າກວາງອື່ນໆແມ່ນຄ້າຂາຍ – ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວແທນຂອງພວກທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆໃນການຄ້າ

ບັນຊີ 	<i>Rucervus eldii</i> ໂອ້ງ-ນັງ	ບັນຊີ 	<i>Rucervus duvaucelii</i> ກວາງບາຣາສິງຫາ	ບັນຈອນໃນ ບັນຊີ CITES	<i>Rusa unicolor</i> ກວາງຊຳປາ
  ຄວາມຍາວຂອງເຂົ້າ: 85 – 117 ຊມ ເສັ້ນຮອບວົງ: 12.5 – 19 ຊມ		10 – 15 ປາຍເຂົ້າກວາງ   ຄວາມຍາວຂອງເຂົ້າ: 75 – 108 ຊມ		3 ປາຍເຂົ້າກວາງ   ຄວາມຍາວຂອງເຂົ້າ: 38 – 108 ຊມ ເສັ້ນຮອບວົງ: 8.5 – 24 ຊມ	
📍 ກຳປູເຈຍ; ອິນເດຍ; ສປປ ລາວ ນຽນນາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ		📍 ອິນເດຍ; ເບປານ		📍 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍນຽນນາ; ຟີລິບປິນ; ໄທ; ຫວຽດນາມ	

- ປາຍຄ້ວກຳຮ່າງເປັນເສັ້ນກົງຕໍ່ເນື່ອງທີ່
ມີງ່າມຫຼັກ
- ເຂົ້າແຂງ
- ປາຍເຂົ້າຊີ້ບ່ອນປາຍ

- ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ *Rucervus eldii*, ແຕ່ເຂົ້າຈະລຽບ
- ງ່າມດ້ານເທິງຊີ້ຂຶ້ນເທິງໂດຍກົງ

- ປາຍເຂົ້າຊີ້ຂຶ້ນເທິງ



ສາຍພັນແມວປ່າ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Wild Felidae spp.	ຊື່ສາມັນ Wild Cat spp.
-----------------------------------	---------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

ແມວທຸກພັນ (ຍົກເວັ້ນແມວລ້ຽງ)



ບັນຊີ

I

Panthera tigris
ເສືອໄຄ່ງ

ບັນຊີ

I

Panthera pardus
ເສືອດາວ

ບັນຊີ I ຂອງ CITES:

- *Panthera tigris* (ເສືອ)
- *Panthera pardus* (ເສືອດາວ)
- *Uncia uncia* (ເສືອຕາວຫີນະ)
- *Neofelis spp.* (ເສືອລາຍເມກ)

- *Catopuma temmincki* (ແມວລາຍຄຳອາຊີ)
- *Pardofelis marmorata* (ແມວລາຍຫີນອ່ອນ)
- *Prionailurus planiceps* (ແມວປ່າຫົວແບນ)
- *Prionailurus bengalensis* (ແມວດາວ)*

* ມີຢູ່ປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

ກະໂຫຼກ

- ກະໂຫຼກນົມ ແລະ ສັ້ນ



ແມວ “ຫົວໄປ”



ເສືອໂຄ່ງ

ແຂ້ວ

- ແຂ້ວ 28 – 30 ເຫຼັ້ມ:
ແຂ້ວໜາກແງ 4 ເຫຼັ້ມ



ແຂ້ວໜ້າ (ແຂ້ວກັດ)

- ນ້ອຍ ແລະ ເປັນແຖວ
- (ຂ້າງເທິງ: 3; ຂ້າງລຸ່ມ: 3) x 2

ແຂ້ວແງ (ແຂ້ວໜາກແງ)

- ຍາວ, ແຫຼມ, ກົງເລັກນ້ອຍ
- (ຂ້າງເທິງ: 1; ຂ້າງລຸ່ມ: 1) x 2


ແຂ້ວກັດ (ແຂ້ວ/ແຂ້ວກົກນ້ອຍ)

- ໃຫຍ່
- (ຂ້າງເທິງ: 2 ຫາ 3 ຂ້າງລຸ່ມ: 2) x 2

ແຂ້ວສຳລັບຄຮູ້ (ແຂ້ວກົກ)

- ຂ້າງເທິງ – ນ້ອຍ
- (ຂ້າງເທິງ: 1; ຂ້າງລຸ່ມ: 1) x 2

ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ ແຂ້ວແງຂອງເສືອແລະ ໝີ



ເສືອ

ໝີ

ແຂ້ວເສືອ:

- ມີ 1 ຮ່ອງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
- ແຂ້ວແງ (ແຂ້ວໜາກແງ) ອາດແຕກ ເມື່ອແຕ້ງ

ເລັບ

- ເກືອບເປັນເຄິ່ງວົງມົນ
- ມີສີເຫຼືອງ/ອຳພັນອ່ອນ
- ອາດໄປັງແສງ
- ໂຄງສ້າງຍື່ນອອກມາຢູ່ເທິງປາຍກະດູກ

ໂຄງສ້າງຍື່ນ
ອອກມາ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ສາຍພັນແນວປ່າ

- 1 “ເຄັກ/ກາວ” ກະດູກ
- 2 ກະໂຫຼກ ແລະ ກະດູກ
- 3 ແຂ້ວ
- 4 ລູກແນວດາວ
- 5 ເລັບ


- 6 ກະດູກ ແລະ ປອກແຂນເພັດພອຍ
- 7 ເຫຼົ້າວາຍກະດູກ
- 8 ໝັງເສື້ອດາວ
- 9 ໝັງເສື້ອໄຟ
- 10 ໝັງເສື້ອ



ກະດູກເສືອ 虎骨
Hǔ gǔ

ກະດູກເສືອດາວ 豹骨
Bào gǔ

ກະດູກສິງໄຕ 狮骨
Shī gǔ



7



8



10



9



ນາກນ້ຳອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຊື່ວິທະຍາສາດ

Lutrinae spp.

ຊື່ສາມັນ

Southeast Asian Otters

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES



ບັນຊີ

Aonyx cinerea

ນາກນ້ຳອາຊີເລັບນ້ອຍ



ບັນຊີ

Lutra lutra

ນາກນ້ຳເອີຣາເຊຍ



ອາຊີ - ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ບຣູໄນ ດາຣາຊາລາມ; ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ; ນຽນມາ; ຟີລິບປິນ; ສິງກາໂປ; ໄທ; ຫວຽດນາມ



ເອີຣົບ ແລະ ອາຊີ. ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ນຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

- ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດານາກນ້ຳ
- ຫົວນ້ອຍ, ນິນ, ດັງສັ້ນ
- ເລັບນ້ອຍຫຼາຍ, ບໍ່ຍິນອອກມາກາຍອ້ຽງເລັບດິນ

- ຂົນສັ້ນ ພ້ອມກັບຂົນຍາວສີ່ອ່ອງ ເຮັດໃຫ້ປາກົດເປັນສີເທົາ
- ປາຍລັກສະນະ “ຕີບເບິນຢູ” ລະຫວ່າງຂົນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າ ແລະ ດັງກ່ຽງ
- ປາຍຫາງມີນັດຕາມແນວຂວາງ



ບັນຊີ

Lutrogale perspicillata

ນາກນ້ຳຂົນລຽບ



ບັນຊີ

Lutra sumatrana

ນົກດັງຂົນ



ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ບຣູໄນ ດາຣາຊາລາມ; ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ; ນຽນມາ; ສິງກາໂປ; ໄທ; ຫວຽດນາມ



ກຳປູເຈຍ; ນາເລເຊຍ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

- ຂົນແວວວາວ
- ປາຍຊີລະຫວ່າງຂົນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າ ແລະ ດັງກ່ຽງ
- ຫາງເປ

- ປາຍດັງປົກຄຸມດ້ວຍຂົນ
- ສີນ້ຳຕານ ນອກຈາກຮິນສົບ, ຄາງ ແລະ ຄໍຂ້າງເທິງທີ່ເປັນສີຂາວ
- ປາຍຫາງມີນັດຕາມແນວຂວາງ



ຂົນ




ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ເຄື່ອງສະສົມ

ນາກນ້ຳອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

- 1 *Aonyx cinerea* (ນາກນ້ຳລຸ້ນນ້ອຍ) ໜັງແຫ້ງ
- 2 *Lutra sumatrana* (ນາກນ້ຳຂົນດັງຫຼາຍ) ໜັງ
- 3 *Lutra perspicillata* (ນາກນ້ຳຜົວລຽບ) ໜັງ
- 4 ໜັງນາກນ້ຳລຸ້ນນ້ອຍ
- 5 ໜັງນາກນ້ຳຂົນດັງຫຼາຍ



ໝີອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້


ຊື່ວິທະຍາສາດ

Helarctos malayanus, Ursus thibetanus

ຊື່ສາມັນ

Southeast Asian Bears


ບັນຊີທັງໝົດ | ຂອງ CITES



ບັນຊີ

Helarctos malayanus

ໝີໝາ/ໝີອຍ



ບັນຊີ

Ursus thibetanus

ໝີດາອາຊີ/ໝີຄວາຍ



ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ບຣູໄນ ດາຣາຊາລາມ;
ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ;
ນຽນນາ; ໄທ



ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ; ສປປ ລາວ;
ນຽນນາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຂົນສັ້ນ
- ຫນ້ອຍ ແລະ ນິ້ນ
- ສີເງົາເປັນຮູບໂຕ “ຢູ” ຫຼື “ວີ” ຢູ່ເທິງໜ້າເອິກ



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຂົນດົກຍາວ
- ຫນ້າໃຫຍ່
- ສີຂາວ ນິ້ນເຄື່ອງໝາຍຮູບໂຕ “ວີ” ຢູ່ເທິງເອິກ



ໝາຍເຫດ: ເບິ່ງໜ້າ 9 ສຳລັບການລິນຫຽບລະຫວ່າງແຂ້ວໝີ ແລະ ແຂ້ວເສືອ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ໝົອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

- 1 ນ້ຳບີບູນກ້ອງແກ້ວ
- 2 ແປ້ງນ້ຳບີ
- 3 ແຂ້ວ
- 4 ເລັບ
- 5 ອີງຕີນ ແລະ ຖົງນ້ຳບີ
- 6 ເນັດນ້ຳບີ

ນ້ຳບີໝີ

熊胆


Xióng dǎn



ສາຍພັນແຮດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Rhinocerotidae spp.	ຊື່ສາມັນ Rhinoceros spp.	ອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ
-------------------------------------	-----------------------------	------------------

ບັນຊີທັງໝົດ 1 ຂອງ CITES

ຍົກເວັ້ນປະຊາກອນຂອງ *Ceratotherium simum simum* ຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ສະວາຊີແລນ ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີ II

ບັນຊີ

I

Diceros bicornis
ແຮດດຳ

ມີ 5 ສາຍພັນຂອງແຮດ:

3 ສາຍພັນພົບເຫັນຢູ່ອາຊີ ແລະ 2 ສາຍພັນຢູ່ອາຟຣິກາ.

ສາຍພັນອາຊີ:

- *Dicerorhinus sumatrensis* (ແຮດສອງນ້ຳ)
- *Rhinoceros sondaicus* (ແຮດນ້ຳດຽວ)
- *Rhinoceros unicornis* (ແຮດນ້ຳດຽວ/ອິນເດຍ)

ສາຍພັນອາຟຣິກາ:

- *Diceros bicornis* (ແຮດດຳ)
- *Ceratotherium simum* (ແຮດຂາວ)



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ສາຍພັນແຮດ

- 1 ນໍ້າໜັດ
- 2 ຜະລິດຕະພັນນໍ້າແກະສະຫຼັກ
- 3 ອັນຍະມະນີທີ່ເຮັດຈາກນໍ້າ
- 4 ການຂຸດນໍ້າ
- 5 ນໍ້າ (ເປັນອັນ)

ນໍ້າແຮດ

犀牛角

Xī niú jiǎo

1



2



3



5



4



ສາຍພັນລິ້ນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ
Pholidota spp.

ຊື່ສາມັນ
Pangolin spp.

ບັນຊີທັງໝົດ I ຂອງ CITES




ບັນຊີ
I
Manis javanica
ລິ້ນງົວ

ສາຍພັນອາຊີ

☉ ອາຊີໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກ, ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

- *Manis javanica* (ລິ້ນງົວ)
- *Manis pentadactyla* (ລິ້ນຄວາຍ)
- *Manis culionensis* (ລິ້ນຟິລິບປິນ)
- *Manis crassicaudata* (ລິ້ນອິນເດຍ)



↗ ຂີ້ນ
↘

ສາຍພັນອາຟຣິກາ

☉ ອາຟຣິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກ, ກາງ ແລະ ຕາເວັນຕົກ

- *Phataginus tetradactyla* (ລິ້ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຄຳ)
- *Smutsia gigantea* (ລິ້ນດິນໃຫຍ່)
- *Smutsia temminckii* (ລິ້ນດິນ)
- *Phataginus tricuspis* (ລິ້ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ)



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງມີເກັດ
- ລິ້ນອາຊີມີຂີ້ນໜາລະຫວ່າງເກັດ
- ລິ້ນອາຟຣິກາບໍ່ມີຂີ້ນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ສາຍພັນລິ້ນ

- 1, 2 ເຄື່ອງປະດັບເກີດແກະສະຫຼັກ
- 3 ຕົວອ່ອນແຫ້ງ
- 4, 5 ຜິງເກັດ
- 6 ເກີດແຫ້ງ
- 7 ໜັງ
- 8 ເກີດທອດ

ສິນ
穿山甲

Chuān shān jiǎ



1



2



8



3



6



4



7



5



ທະນີ ແລະ ລິງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Primate spp.	ຊື່ສາມັນ Apes and Monkeys	📍 ອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາເມຣິກາ ໃຕ້ ແລະ ກາງ
------------------------------	------------------------------	--


ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

ບັນຊີ I ຂອງ CITES ໄດ້ລະບຸສາຍພັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ລວມເຖິງ:

ທະນີໃຫຍ່ທັງໝົດ
(Hominidae spp.) ເຊັ່ນ ລິງອູຣາອູ
ຕັງ, ລິງຊິນແປນຊີ


ທະນີທັງໝົດ (Hylobatidae spp.)
ເຊັ່ນ ທະນີມີຂາວ, ທະນີແກ້ມແດງ,
ທະນີນົງກຸດ

ຂາແດງທັງໝົດ (Pygathrix spp.)
ເຊັ່ນ ຄ່າງຂາຂີ້ເຖົ້າ



ບັນຊີ
I

Pongo abelii
ລິງອູຣາອູຕັງເກາະສຸມາດຣາ



ບັນຊີ
I

Hylobates lar
ທະນີມີຂາວ




ບັນຊີ
I

Pygathrix cinerea
ຄ່າງຂາຂີ້ເຖົ້າ

ລິງດັງແບນທັງໝົດ
(Rhinopithecus spp.) ເຊັ່ນ ລິງດັງ
ແບນມຽນມາ, ລິງດັງແບນທອກກຽນ

ລິງລົມ ທຸກຊະນິດ
(Nycticebus spp.)



ບັນຊີ
I

Rhinopithecus avunculus
ລິງດັງແບນທອກກຽນ



ບັນຊີ
I

Nycticebus coucang
ລິງລົມຊິນດາ

ສັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ສາຍຕາເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ
- ດັງສິ້ນ, ໜ້າແປນ
- ນິ້ວມື (ແທນທີ່ຈະເປັນເລັບ)
- ສີຂາ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງສະສົມ
ຢາ

ທະນີ ແລະ ລິງ

- 1 *Nycticebus pygmaeus* (ລິງລືມພິກນີ)
- 2 ກະໄຫຼກລິງ
- 3 *Pygathrix nemaeus* (ຄ່າງຂາສີຂີ້ເຖົ່າ)
- 4 *Nycticebus bengalensis* (ລິງລືມເບງກອລ) ເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງ
- 5 ທະນີໃຫຍ່ສະແດງໃນໂຮງລະຄອນສັດ
- 6 ລູກ *Pongo abelii* (ອຸຮາອຸຕິນເກາະສຸມາຕຣານ)



ສາຍພັນຊ້າງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Elephantidae spp.	ຊື່ສາມັນ Elephant spp.
ບັນຊີທັງໝົດ ຂອງ CITES	
ຍົກເວັ້ນປະຊາກອນຂອງ <i>Loxodonta africana</i> ປະຊາກອນຂອງບັອດສະວານາ, ນາມິເບຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ຊິບັບເວ ເຊິ່ງໄດ້ນອນໃນບັນຊີ **	
 ບັນຊີ <i>Elephas maximus</i> ຊ້າງອາຊີ	 ບັນຊີ <i>Loxodonta africana</i> ຊ້າງອາຟຣິກາ
📍 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ບຣູໄນ ດາຣູຊາລານ; ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ມາໂລເຊຍ; ມຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ	📍 ຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ

ອັດຕຸທິດແທນສຳລັບງາທັງໝົດ ຫຼື ແກະສະຫຼັກ:

ອັດຕຸທິດແທນທຳມະຊາດ: ແມ້ນນອດ
 ປານາວານ
 ສິງໂຕທະເລ
 ປາວານ
 ໝູ່ປ່າອານຸສາຫາຣາອາຟຣິກາ
 ຮິບໄປ
 ກະດູກ
 ນົກຊື່ນຫີນ
 ໝາກປາມທາກົວ

ອັດຕຸທິດແທນທີ່ສັງເຄາະ: ຢາງໄມ້
 ເຄຊິນ

* ນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
 ກວດເບິ່ງບັນຊີຂອງ CITES ທີ່ www.cites.org



ງາຊ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອັດຕູທິດແທນ:

ພາຍໃຕ້ແສງອັນຕຣາໄວໄອເລັດ


- ງາຊ້າງແມ້ນນອດ ແລະ ງາຊ້າງເບິ່ງຄືໄປ່ງແສງສີຂາວ/ສີຟ້າ
- ງາຊ້າງແມ້ນນອດອາດສະແດງຮອຍສີນ້ຳຕານ ຫຼື ຟ້າຂຽວ, ງາຊ້າງບໍ່ສະແດງ

ເສັ້ນສະກົດເຈີ


- ເສັ້ນທຳມະຊາດທີ່ຄົ້ນພົບໃນເສັ້ນຕັດຕາມຂວາງທີ່ເງົາວາວຂອງງາຊ້າງທຳມະຊາດ ຫຼື ງາຊ້າງແມ້ນນອດ



ການປຽບທຽບລະຫວ່າງງາຊ້າງ ແລະ ງາຊ້າງແມ້ນນອດ



ງາຊ້າງ:
ມູນເສັ້ນສະກົດເຈີສະເລ່ຍ:
ຫຼາຍກວ່າ 100 ອົງສາ



ງາຊ້າງແມ້ນນອດ:
ມູນເສັ້ນສະກົດເຈີສະເລ່ຍ:
ໜ້ອຍກວ່າ 100 ອົງສາ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊື່ຈິດ
ເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ສາຍພັນຊ້າງ

- 1 ອັນຍະມະນີທີ່ເຮັດຈາກໜັງ
- 2 ຜົງຜົວໜັງ
- 3 ຜົວໜັງ
- 4 ຜະລິດຕະພັນໜັງ

- 5 ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກແກະສະຫຼັກທີ່ເຮັດມາຈາກງາ
- 6,7 ອັນຍະມະນີທີ່ເຮັດມາຈາກຂົນຫາງ
- 8 ແຂ້ວ
- 9 ອັນຍະມະນີທີ່ເຮັດມາຈາກງາ

1




2



4



3







ນົກ

Bucerotidae spp.	28	ຊະນິດພັນຂອງນົກກິກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
Falconiformes spp.	30	ຊະນິດພັນຂອງນົກລ່າເຍື່ອ
Accipitriformes spp.		
Strigiformes spp.	32	ຊະນິດພັນຂອງນົກເຄົ້າ
Psittaciformes spp.	34	ຊະນິດພັນຂອງນົກແກ້ວ
<i>Gracula religiosa</i>	36	ນົກສາລິກາ
<i>Kittacincla malabaricus</i>	37	ນົກແຕ້ນປູນ




ການຈຳແນກສັດປ່າທີ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍເປັນປະຈຳໂດຍເນັ້ນໃສ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ
ຊະນິດພັນນິກົກກ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ຊື່ວິທະຍາສາດ Bucerotidae spp.	ຊື່ສາມັນ Southeast Asian Hornbill spp.	📍 ທຸກປະເທດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້
----------------------------------	---	--------------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

4 ຊະນິດຂອງນິກົກກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ນອນໃນບັນຊີ I ຂອງ CITES:
Aceros nipalensis (ນິກົກກຄໍແດງ); *Buceros bicornis* (ນິກົກກຄໍຄຳ); *Rhinoplax vigil* (ນິກົກກຊິນຫີນ); *Rhyticeros subruficollis* (ນິກົກກຄາງຊ້າງປາກລຽບ)



ບັນຊີ I
Rhinoplax vigil
ນິກົກກຊິນຫີນ



ບັນຊີ II
Buceros rhinoceros
ນິກົກກຫົວແຮດ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຂະໜາດໃຫຍ່
- ນິກົກກອາຊີນັກຈະມີລຳໂຕສີດຳ/ນ້ຳຕານເຂັ້ມ ແລະ ມີຫາງສີຂາວ ແລະ ດຳ
- ມີ (ຫອນ) ທີ່ໜ້າແຂງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໂຕ້ງຮິນສິບ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍັງມີຊີວິດ
ເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງປະດັບ

ຊະນິດພັນນົກກົກ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

- 1, 2, 3 ເຄື່ອງປະດັບເຮັດມາຈາກຫອນຂອງ *Rhinoplax vigil* (ນົກກົກຊົນຫີນ)
- 4 ຫົວດິບ, ນົກກົກຊົນຫີນ
- 5 *Anthracosceros albirostris* (ນົກແກງງ) ທີ່ຍັງໃຫຍ່ບໍ່ເຕັມໄວ
- 6 ຫົວ, *Buceros bicornis* (ນົກ ກົກຄໍຄຳ)
- 7 ຫອນ, ນົກ ກົກຄໍຄຳ



ຊະນິດນົກລ່າເຫຍື່ອ*

ຊື່ວິທະຍາສາດ Falconiformes spp., Accipitriformes spp.	ຊື່ສາມັນ Birds of Prey spp.	ທີ່ວິລາກ 📍
---	--------------------------------	---------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

5 ຊະນິດຂອງນົກລ່າເຫຍື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຳມະນາໄນບັນຊີ I ຂອງ CITES: *Aquila heliaca* (ແຫລວປານ້ອຍ); *Haliaeetus albicilla* (ນົກອິນຊີທະເລຫາງຂາວ); *Pitheophaga jefferyi* (ນົກອິນຊີພິລິບປິນ); *Falco jugger* (ແຫຼວລັກກາ); *Falco peregrinus* (ແຫຼວເພຣກຣິນ)



ບັນຊີ I
Falco peregrinus
ແຫຼວເພຣກຣິນ



ບັນຊີ II
Circus melanoleucos
ແຫຼວດ່າງດຳຂາວ (ໄຕຜູ້)



ບັນຊີ II
Circus melanoleucos
ແຫຼວດ່າງດຳຂາວ (ໄຕແມ່)



ບັນຊີ II
Accipiter trivirgatus
ແຫຼວເຂົາງອນ



ບັນຊີ II
Spizaetus cirrhatus
ແຫລວນູນ



ບັນຊີ II
Haliaeetus indus
ແຫລວຫົວຂາວ ໄຕແດງ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ມີທ່າທາງທີ່ສະຫງ່າ
- ປາກແຫຼມຄົມ
- ເລັບແຫຼມ

* ລວມເຖິງແຫຼວ, ນົກອິນຊີ, ແຮ້ງ, ນົກລ່າເຫຍື່ອ ແລະ ແຫຼວຊະນິດອື່ນໆ.



ຊະນິດນົກລ່າເຫຍື່ອ

- 1 *Elanus caeruleus* (ແຫຼວຂາວ) ທີ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ
- 2 *Accipiter trivirgatus* (ແຫຼວເຂົາງອນ) ທີ່ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ
- 3 ແຫຼວຂາວ ທີ່ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ
- 4 *Microhierax fringillarius* (ແຫຼວແມງປໍຂາດຳ) ທີ່ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ
- 5 *Circus melanoleucos* (ແຫຼວດຳງຸດຳຂາວ)
- 6 *Spizaetus cirrhatus* (ແຫລວນູນ) ທີ່ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ




ຊະນິດນົກເຄົ້າ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Strigiformes spp.	ຊື່ສາມັນ Owl spp.	📍 ທົ່ວໂລກ (ຍົກເວັ້ນ ແອນດາກຕິກາ)
-----------------------------------	----------------------	---------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

1 ຊະນິດຂອງນົກເຄົ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ນ່ອນໃນບັນຊີ I ຂອງ CITES:
Otus gurneyi (ນົກເຄົ້າກູ່ງໃຫຍ່)



ບັນຊີ

*Bubo sumatranus*

ນົກເຄົ້າໃຫຍ່ສາຍພັນສູນາຕາ



ບັນຊີ

*Ketupa ketupu*

ນົກເຄົ້າສາຍພັນມາລາຢູ



ບັນຊີ

*Strix leptogrammica*

ນົກເຄົ້າປາລີນ້ຳຕານ



ບັນຊີ

*Otus bakkamoena*

ນົກເຄົ້າກູ່ງ



ບັນຊີ

*Glaucidium cuculoides*

ນົກເຄົ້າແມວ



ບັນຊີ

*Athene brama*

ນົກເຄົ້າຈຸດ (ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ)

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຫົວມີນໃຫຍ່ພ້ອມກັບໜ້າແບນ
- ຕາໃຫຍ່, ແນມໄປດ້ານໜ້າ
- ປາກຄົມ, ບໍ່ຍື່ນອອກມາຈາກໃບໜ້າ
- ເລັບແຫຼມ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ

ຊະນິດນົກເຄົ້າ

- 1 *Otus lempiji* (ນົກເຄົ້າກຸ່)
- 2 *Strix leptogrammica* (ນົກເຄົ້າປ່າສີນ້ຳຕານ) ທີ່ຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ
- 3 *Ketupa ketupu* (ນົກເຄົ້າສາຍພັນນາລາຢູ) ທີ່ຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ
- 4 *Tyto alba* (ນົກແສກ)
- 5 *Bubo sumatranus* (ນົກເຄົ້າສາຍພັນສູນາຕາ) ທີ່ຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ
- 6 *Athene brama* (ນົກເຄົ້າຈຸດ)



ຊະນິດນົກແກ້ວ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Psittaciformes spp.	ຊື່ສາມັນ Parrot spp.	ອາພິກາ; ອາເມລິກາ ໃຕ້ ແລະ ກາງ; ອາຊີ; ໂອເຊອານີ
-------------------------------------	-------------------------	---

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

ໂດຍນິ້ຂຶ້ນເອ້ນຂອງ: *Agapornis roseicollis* (ນົກເລີບເບີດໜ້າລູກພິຈ);
Melopsittacus undulatus (ນົກຫົວຫຍິກ); *Nymphicus hollandicus* (ນົກຄໍອກກາ
 ເທວ); *Psittacula krameri* (ນົກແກ້ວຄໍແທວນ)




ບັນຊີ

II

Psittacula alexandri
 ນົກແກ້ວເອີກແດງ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຫົວໃຫຍ່, ຄໍສັ້ນ
- ສີບກວ້າງ
- ມັກມີສຽງດັງ ແລະ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ
- ດິນ: ສອງນິ້ວຊີໄປທາງໜ້າ, ສອງນິ້ວຊີໄປທາງດ້ານຫຼັງ



ບັນຊີ

II

Eclectus roratus

ສາຍພັນນົກແກ້ວພື້ນເມືອງຢູ່ໝູ່ເກາະເຊໂລມອນ
 ປະເທດອັດສະຕະເລຍ (Eclectus Parrot)

ເບື້ອງຊ້າຍ: ໂຕຜູ້ (ສີຂຽວໃຫຍ່), ເບື້ອງຂວາ: ໂຕແມ່ (ຫົວ ແລະ ເອີກສີແດງ, ປີກ ແລະ ຫ້ອງສີນ້ອງ).



ຕົວຢ່າງນົກແກ້ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ນັກພົບເຫັນໃນການຄ້າຂາຍ

ຄ້າຂາຍເປັນ:
ແບບຍັງມີຊີວິດ

ນົກກະຕ້ອ ຂະໜາດໃຫຍ່, ຫອນສາມາດຍົກຂຶ້ນໄດ້, ມີສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຕົວຢ່າງ. ຂາວ, ບິວ, ຂີ້ເທົ່າ, ດຳ)



ບັນຊີ
I

Probosciger aterrimus
ນົກກະຕ້ອດຳ

ໃຫຍ່, ນົກກະຕ້ອສີດຳໝົດໂຕ, ມີຫອນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຜິວເທິງໜ້າສີແດງ, ປາກແຫຼມຂະໜາດໃຫຍ່.



ບັນຊີ
I

Cacatua sulphurea
ນົກກະຕ້ອຫອນເຫຼືອງ

ຂົນສີຂາວ, ຮອຍສີເຫຼືອງບໍລິເວນແກ້ມ, ຫອນສີເຫຼືອງ.



ບັນຊີ
II

Cacatua galerita
ນົກກະຕ້ອຫອນສີກຳນະຖັນ

ໃຫຍ່, ຂົນສີຂາວ, ຫອນສີເຫຼືອງ.

ນົກແກ້ວ ຂະໜາດກາງຫາໃຫຍ່, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສີຂຽວພ້ອມກັບຂົນຫາງບໍລິເວນກາງທີ່ຍາວ



ບັນຊີ
II

Psittacula alexandri
ນົກແກ້ວເອີກແດງ

ເອີກສີແດງ ແລະ ລາຍສີດຳເຂັ້ມເທິງຄໍ, ປາກສີແດງແມ່ນໂຕຜູ້, ສີດຳແມ່ນໂຕແມ່.



ບັນຊີ
II

Psittacula longicauda
ນົກຫາງຍາວ

ໜ້າສີແດງ, ເອີກສີຂຽວ, ປາກສີແດງແມ່ນໂຕຜູ້ (ເບື້ອງຂວາ), ສີດຳແມ່ນໂຕແມ່ (ເບື້ອງຊ້າຍ).



ບັນຊີ
II

Psittacula eupatria
ນົກແກ້ວໂມ້ງ

ຂະໜາດໃຫຍ່, ປາກສີແດງໃຫຍ່, ຮອຍບ່າສີແດງ.

ນົກຫົກ ນ້ອຍຫຼາຍ (12–15 ຊມ), ຫາງສັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສີຂຽວ



ບັນຊີ
II

Loriculus vernalis
ນົກຫົກນ້ອຍປາກແດງ

ປາກແດງ, ຕາສີຂາວປົນສີເຫຼືອງອ່ອນ, ຮອຍສີຟ້າອ່ອນບໍລິເວນຄໍ.



ບັນຊີ
II

Loriculus galgulus
ນົກຫົກປາກດຳ

ປາກດຳ, ຕາຄຳ, ຮອຍສີຟ້າເຂັ້ມເທິງຫົວ.



ນົກສາລິກາສານັນ

ຄ້າຂາຍເປັນ:
ແບບຍິ່ງນິຊີວິດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Gracula religiosa</i>	ຊື່ສາມັນ Common Hill Myna	📍 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
--	------------------------------	------------------------

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



ບັນຊີ II
Gracula religiosa
ນົກສາລິກາສານັນ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ໂຕໃຫຍ່ ພ້ອມກັບຂົນສີດຳເງິກທີ່ສີດໃສ
- ຮອຍສີຂາວໃນປີກແຕ່ລະຂ້າງ
- ຂາ ແລະ ຕີນສີເຫຼືອງ
- ໜຽວສີເຫຼືອງອ່ອນ
- ປາກສີເນັ້ນປົນສີເຫຼືອງທີ່ປາຍ



ຄ້າຍຄືກັບ:

Acridotheres tristis
ນົກອ້ຽງໂມ່ງ

- ຮອຍສີເຫຼືອງເທິງໃບໜ້າອ້ອມຕາ
- ບໍ່ມີໜຽວ
- ເອິກສີນາຕານ
- ປາຍຫາງມີສີຂາວ

ບໍ່ນອນໃນ
ບັນຊີ CITES



ນົກແຕ້ມປູນ

ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງນິຊີອິດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Kittacincla malabaricus</i>	ຊື່ສາມັນ White-rumped Shama	📍 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ; ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ມາເລເຊຍ; ນຽນມາ; ສິງກະໂປ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
--	--------------------------------	--

ບ່ອນອາໄສ ບັນຊີ CITES

	ບ່ອນອາໄສ ບັນຊີ CITES <i>Kittacincla malabaricus</i> ນົກແຕ້ມປູນ; ໂຕຜູ້	· ທ້ອງສີດຳຟ້າເງົາປົນສີສົ້ມ · ສະຍະໄພກສີຂາວ · ຂົນສີຂາວຢູ່ລຸ່ມຫາງ, ຂົນເຫຼົ້ານີ້ອາດເຫັນໄດ້ຈາກສັນປາຍທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງ
	ບ່ອນອາໄສ ບັນຊີ CITES <i>Kittacincla malabaricus</i> ນົກແຕ້ມປູນ; ໂຕແມ່	· ທ້ອງສີເທົາປົນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ
	ບ່ອນອາໄສ ບັນຊີ CITES <i>Kittacincla malabarica stricklandii</i> ນົກແຕ້ມປູນ; ໂຕຜູ້	· ສາຍພັນຍ່ອຍແມ່ນພົບໄດ້ໃນພາກເໜືອໝູ່ເກາະບໍ່ນຽວ ປະເທດອັງກິດ · ນິສີຂາວເທິງຫົວ

ຄ້າຍຄືກັບ:

Copsychus saularis
ນົກກາງເຂນບ້ານ

- ສີດຳເງົາ
- ນ້ອຍກວ່ານົກກາງເຂນດົງ ພ້ອມກັບຫາງທີ່ສັ້ນກວ່າ
- ທ້ອງ ແລະ ກ້ອງຫາງເປັນສີຂາວ
- ລາຍປົກສີຂາວ





ສັດເລືອຄານ

<i>Gekko gekko</i>	40	ກັບໄກ້
Varanidae spp.	42	ຊະນິດພັນເຫັຍ
<i>Ophiophagus, Naja</i> spp.	44	ຊະນິດພັນຂອງງູເຫົ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
Pythonidae spp.	46	ຊະນິດພັນຂອງງູເຫຼືອມ
Cheloniidae	48	ເຕົ້າທະເລ
Dermochelyidae		
<i>Batagur</i> spp.	50	ເຕົ້າປາກແມ່ນ້ຳ
<i>Geoclemys hamiltonii</i>	52	ເຕົ້າບິງຈຸດ
<i>Heosemys grandis</i>	54	ເຕົ້າຫວາຍ
<i>Cuora</i> spp.	56	ຊະນິດພັນເຕົ້າຄຳ
<i>Platysternon megacephalum</i>	58	ເຕົ້າກຸຍ
Testudinidae spp.	60	ຊະນິດພັນຂອງເຕົ້ານ້ຳຈືດ
<i>Geochelone elegans</i>	62	ເຕົ້າດາວ
<i>Geochelone platynota</i>		
<i>Astrochelys radiata</i>		
<i>Indotestudo elongata</i>	64	ເຕົ້າເພັກ
<i>Manouria emys</i>	66	ເຕົ້າຫົກ
<i>Manouria impressa</i>		ເຕົ້າເຕືອຍ
<i>Amyda cartilaginea</i>	68	ເຕົ້າອອງອ່ອນ
<i>Dogania subplana</i>		
<i>Pelodiscus sinensis</i>		



ກັບໂຕ້

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Gekko gekko</i>	ຊື່ສາມັນ Tokay Gecko	📍 ຫົວອາຊີເຂດຮ້ອນຕາເວັນອອກ
------------------------------------	-------------------------	---------------------------

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



ບັນຊີ II
Gekko gekko
ກັບໂຕ້

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ໃຫຍ່ຫຼາຍ (ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 38 ຊມ)
- ໜັງສືຟ້າອິນເທົາອ່ອນ ມີຈຸດສີສົ້ມ ແລະ ສີຂາວຊື່ດເຈນ
- ຕາໃຫຍ່, ແກ່ນຕາດຳເປັນທາງຍາວແບບ ແນວຕັ້ງ
- ບໍ່ມີເປືອກຕາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້
- ນິ້ວຕີນເປັນສັນແບບນກວ້າງ, ສາມາດຍ່າງເທິງພື້ນຜິວແນວຕັ້ງໄດ້



ຄ້າຍຄືກັບ:

Eublepharis spp.

- ເປືອກຕາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້
- ນິ້ວຕີນລຽບແຄບ, ບໍ່ສາມາດປີນທາງແນວຕັ້ງໄດ້

ຕົວຢ່າງ: *Eublepharis macularius*
ກັບແກ່ເສືອດາວທົ່ວໄປ

- ຫົວກວ້າງ, ຫາງຕຸ້ຍ
- ໜັງເປັນຂຸມຢູ່ດ້ານເທິງ, ລຽບດ້ານລຸ່ມ
- ໂຕໃຫຍ່ມັກຈະມີລາຍທີ່ເປັນຈຸດຄືເສືອດາວ ຫຼື ຈຸດທີ່ແຖບແນວນອນໜາ
- ຮູບພາບສະແດງການປ່ຽນສີທີ່ໄວ, ແຕ່ມີຫຼາຍສີການປ່ຽນສີຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອຕົກຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ



ບ່ອນອື່ນ
ບັນຊີ CITES



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ຢາ

ກັບໂຈ້

- 1 ສຳລັບໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ
- 2 ສຳລັບກຸານຂາຍໃນຕະຫຼາດ
- 3 ແຊ່ໃນເຫຼົ້າແວງສຳລັບເປັນຢາພື້ນເມືອງ



1



3



2



ຊະນິດພັນ ເຫັຍ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Varanidae spp.	ຊື່ສາມັນ Monitor Lizard spp.	📍 ອາຟຣິກາ, ອາຊີ ແລະ ໂອເຊອານີ. ພົບເຫັນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ ໃຕ້.
--------------------------------	---------------------------------	---

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

4 ຊະນິດພັນຂອງກັບແກ້ມນິເຕີອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຳນອນໃນບັນຊີ I ຂອງ CITES:
Varanus bengalensis (ແລນ); *Varanus flavescens* (ແລນເຫຼືອງ);
Varanus komodoensis (ນົງກອນໂຄໂມໂດ); *Varanus nebulosus* (ແລນລາຍເມກ)




ບັນຊີ
I

Varanus bengalensis
ແລນ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຫູເປີດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້
- ລື້ນເປັນງ່າມ
- ຫາງທີ່ແຂງແຮງ
- ຂາທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ເລັບແຫຼມ
- ຄໍຍາວ
- ຫົວແຄບ ແລະ ປາກ ແລະ ດັງແຫຼມ



ຫູເປີດ

ບັນຊີ
II

Varanus salvator
ເຫັຍທົ່ວໄປ



ບັນຊີ
I

Varanus nebulosus
ແລນລາຍເມກ




ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ຊະນິດພັນ ເຫຼັຍ

- 1 ໝັງ *Varanus salvator* (ເຫຼັຍ)
- 2 ເຫຼັຍແຊ່ເຫຼົ້າແວ່ງ
- 3 ເກີບເຮັດມາຈາກໝັງ
- 4 *Varanus prasinus* (ແລນຂຽວ)
- 5 ເຫຼັຍ



ການຈຳແນກສັດປ່າທີ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍເປັນປະຈຳໂດຍເນັ້ນໃສ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ
ຊະນິດພັນ ງູເຫົ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Ophiophagus, Naja spp.</i>	ຊື່ສາມັນ Southeast Asian Cobra spp.	ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທຸກປະເທດ
---	--	---------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ II ຂອງ CITES


ຊະນິດພັນ ງູເຫົ່າອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທັງໝົດທີ່ນອນໃນບັນຊີ II ຂອງ CITES



ບັນຊີ II *Ophiophagus hannah*
 ງູຈິງອາງ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:


- ເກັດຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຕາ (ຂ້າງໜ້າຂອງດວງຕາ) ສຳຜັດກັບຮູດັງໃນງູເຫົ່າ, ງູສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ງູປະກາລັງ (ຕາ ແລະ ຮູດັງຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍກວ່າງອື່ນໆ)
- ມີພຽງງູເຫົ່າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດແຜ່ຄິນແນວຕັ້ງໄດ້
- ເກັດຫົວຫຼັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ ລັກສະນະຂອງ *Ophiophagus hannah* (ງູຈິງອາງ)
- ບໍ່ມີເກັດໃນງູອີລາພິດ ແລະ ງູຈຳພວກອື່ນໆ




ຄ້າຍຄືກັບ:

Coelognathus radiatus
 ງູຫອງແດງ

- ແຜ່ຄິດ້ານຫຼັງແບບລຽບເພື່ອຮຽນແບບງູເຫົ່າ



ເກັດລະຫວ່າງຕາ ແລະ ຮູດັງ




ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ຊະນິດພັນ ງເຫົ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

- 1 ງເຫົ່າຕາຍ
- 2 ເກີບເລືອດຈາກ *Ophiophagus hannah* (ງູຈິງອາງ)
- 3, 5 ພິກຍ່ຽວ, ແຫ້ງ ແລະ ສິດ
- 4 ໝັງ
- 6 *Naja sputatrix* (ງູເຫົ່າພິນພິດທາງພາກໃຕ້ຂອງອີກເນເຊຍ) ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
- 7 ງເຫົ່າທີ່ລອກໝັງ



ຊະນິດພັນ ງູເຫຼືອມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Pythonidae spp.	ຊື່ສາມັນ Python spp.	📍 ອາຟຣິກາ, ອາຊີ ແລະ ອິດສະຕຣາລີ
---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ II ຂອງ CITES

ຍົກເວັ້ນ: *Python molurus molurus* (ງູຫລາມ) ທົນອນໃນບັນຊີ I ຂອງ CITES



ບັນຊີ II *Malayopython reticulatus*
ງູເຫຼືອມ



ບັນຊີ II *Python bivittatus*
ງູເຫຼືອມມຽນມາ

- ຍາວເຖິງ 9.8 ມ
- ເສັ້ນແຄບລົງໄປຈົນເຖິງໃຈກາງຂອງດ້ານເທິງຂອງຫົວ ແລະ ອີກຂ້າງຈາກດ້ານຫຼັງຂອງຕາເຖິງດ້ານຂ້າງຂອງປາກ
- ທາງຫຼັງເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ນ້ຳຕານພ້ອມກັບເຄື່ອງໝາຍສີເຂັ້ມ

- ຍາວເຖິງ 7 ມ
- ຮູບແບບລົມສີເຂັ້ມຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຫົວ, ດ້ານລຸ່ມຂອງຫົວ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງຕາ
- ຮອຍດ່າງລີ້ນ້ຳຕານເປັນນຸ່ມຂອບດຳຢູ່ດ້ານຫຼັງ



ບັນຊີ II *Python brongersmai*
ງູຫຼາມປາກເປັດຫາງສິ້ນ



ບັນຊີ II *Morelia viridis / Morelia azurea*
ງູຫຼາມຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ

- ຍາວສູງເຖິງ 2.4 ມ; ໂຕໜາ ແລະ ຫາງສິ້ນ
- ທາງຫຼັງເປັນສີນ້ຳຕານແດງ, ສີເທົາ ຫຼື ນ້ຳຕານ
- ແຖບສີເຂັ້ມແຄບລົງທາງດ້ານກາງຂອງໜ້າຜາກ
- ດ້ານຂ້າງຂອງໂຕເປັນສີເຫຼືອງຊົດ ພ້ອມກັບວົງ ແລະ ລາຍສີເຂັ້ມ

- ຍາວເຖິງ 2 ມ; ນັກກ້ຽວເປັນວົງມົນເທິງງ່າໄມ້
- ພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນການຄ້າຂາຍສັດລ້ຽງ
- ຕອນທີ່ຍັງບໍ່ໃຫ່ຍເຕັມໄວ (ດ້ານຂວາ) ບໍ່ເຄີຍເປັນສີຂຽວ, ອາດເປັນສີເຫຼືອງ, ສີນ, ແດງ ແລະ ອື່ນໆ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຮູທີ່ໄວຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
- ເດືອຍນ້ອຍສອງອັນ (ແຂນຂາທີ່ເປັນຮອຍ) ສາມາດພົບໄດ້ດ້ານໃດກໍໄດ້ຂອງຮູທະວານ (ສ່ວນເປີດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຖານຂອງຫາງ)



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ຊະນິດພັນ ງູເຫຼືອນ

- 1, 2, 5 ຜະລິດຕະພັນເຮັດມາຈາກໜັງ
3 *Malayopython reticulatus* (ງູເຫຼືອນ)
4 ໜັງສາລົບຂາຍ



ເຕົ້າທະເລ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Cheloniidae and Dermochelyidae	ຊື່ສາມັນ Marine Turtles	📍 5 ຊະນິດພັນ ຖືກພົບເຫັນໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
---	----------------------------	---

ບັນຊີທັງໝົດ | ຂອງ CITES

CHELONIIDAE	- ອອງຖືກຫຸ້ມດ້ວຍເກັດ - ເລັບ 1 – 2 ອັນ ທີ່ຂອບດ້ານໜ້າຂອງຕີນດ້ານໜ້າ
--------------------	---



ບັນຊີ
| *Eretmochelys imbricata*
ເຕົ້າກະ



ບັນຊີ
| *Caretta caretta*
ເຕົ້າຫົວຄ່ອນ



ບັນຊີ
| *Chelonia mydas*
ເຕົ້າຂຽວ



ບັນຊີ
| *Lepidochelys olivacea*
ເຕົ້າຫຍ້າ

DERMOCHELYIDAE	- ອອງມີເຈັດກະດູກ (ສັນ) ແລະ ຫຸ້ມດ້ວຍໜັງໜຽວ - ຕີນໜ້າບໍ່ມີເລັບ
-----------------------	--



ບັນຊີ
| *Dermochelys coriacea*
ເຕົ້າຫຼ່ຽມ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ຂາໜ້າທຸກຊະນິດເປັນຮູບໄມ້ພາຍ
- ຫົວ ແລະ ຂາບໍ່ສາມາດຖອດໄປໃນອອງໄດ້



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງປະດັບ
ຢາ

ເຕົ້າທະເລ

- 1 ເຕົ້າກະ *Eretmochelys imbricata* (ຍັດ)
- 2, 3 ສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດມາຈາກອ່ອງເຕົ້າກະ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ ເປັກໂກ)
- 4 ຟັກໄຂ່
- 5 ຊີນ
- 6 ໄຂ່
- 7 ອັນຍະນະນີເຮັດມາຈາກເປັກໂກ ແລະ ໄຂ່ກາ



1



2



3



7



4



6



5



ເຕົ້າກະອານ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Batagur spp.</i>	ຊື່ສາມັນ Batagur River Terrapins
-------------------------------------	-------------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES*

* ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການຄ້າຂາຍສັດປ່າດົວຢ່າງລະຫວ່າງປະເທດ



ບັນຊີ

I

Batagur baska
ເຕົ້າກະອານເໜືອ

ບັນຊີ

I

Batagur affinis
ເຕົ້າກະອານໃຕ້

ບັງກລາເທດ; ອິນເດຍ; ມຽນມາ



ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ມາເລເຊຍ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

ເລັບ

· ເລັບ 4 ອັນຢູ່ຕີນດ້ານໜ້າ

· ເລັບ 4 ອັນຢູ່ຕີນດ້ານໜ້າ

ໂຕຜູ້

- ຫົວ ແລະ ຄໍເປັນສີດຳເຂັ້ມ ຈິນເຖິງແດງເຂັ້ມ
- ດ້ານຖານຂອງຄໍ
- ດັງສີຟ້າເຄືອບເງົາ

· ຫົວສີດຳເທົາ(ບໍ່ມີສີແດງ)

ສາຍພັນໂຕຜູ້

- ຂາໜ້າສີແດງ
- ຕາສີຂຽວເຫຼືອງ

- ໜັງ ແລະ ອອງເປັນສີດຳ ຫາ ສີຊ້ອກໂກແລັດ-ສີນາຕານ
- ຕາກາຍເປັນສີຂາວ ຫຼື ຕາຄຳ



ໂຕແມ່





ບັນຊີ
II* *Batagur borneoensis*
ເຕົ້າລາຍຕີນເປັດ

☉ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລານ; ອິນໂດເນເຊຍ; ມາເລເຊຍ; ໄທ

· ເລັບ 5 ອັນຢູ່ຕີນດ້ານໜ້າ

- ຫົວສີເທົາ ພ້ອມກັບລາຍສົ້ມນ້ຳຕານ
- ອອງສີດຳນ້ຳຕານ ພ້ອມກັບ 3 ວົງກວ້າງສີດຳລາຍ, ຂອບເກັດອາດຈະມີລວດລາຍສີດຳ

- ຫົວສີຂາວ, ຂອບດຳລາຍແດງ
- ອອງສີຂາວຄຣິນ, ລວດລາຍສີດຳຄືກັບໂຕຜູ້ທີ່ໄດ້ປະສົມພັນ



- ຫົວສີຂາວ, ຂອບດຳລາຍແດງ
- ອອງສີຂາວຄຣິນ, ລວດລາຍສີດຳຄືກັບໂຕຜູ້ທີ່ໄດ້ປະສົມພັນ



ບັນຊີ
II* *Batagur trivittata*
ເຕົ້າທະເລມຽນນາ

☉ ມຽນມາ

· ເລັບ 5 ອັນຢູ່ຕີນດ້ານໜ້າ

- ຫົວສີຂຽວ-ເຫຼືອງ ພ້ອມກັບແຖບສີດຳເດັ່ນຍື່ນອອກມາຈາກຮູດັງ
- ອອງສີໝາກກອກຂຽວທີ່ມີແຖບສີດຳສາມແຖບ

- ຫົວສີຂຽວເຫຼືອງແຈດ ພ້ອມກັບແຖບສີດຳເດັ່ນຍື່ນອອກມາຈາກຮູດັງ



- ສີນ້ຳຕານດຳໄປຈົນເຖິງດຳເທົາຄືກັນ

ເຕົ້າບິງຈຸດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Geoclemys hamiltonii</i>	ຊື່ສາມັນ Spotted Pond Turtle	ບັງກລາເທດ; ອິນເດຍ; ເນປານ; ປາກິດສະຖານ
---	---------------------------------	---

ບັນຊີ I ຂອງ CITES



ບັນຊີ

I

Geoclemys hamiltonii

ເຕົ້າບິງຈຸດ

ຄ້າຍຄືກັນ:

Clemmys guttata

ເຕົ້າຈຸດ

- ລວງຍາວອອກ: ຍາວເຖິງ 12.5 ຊມ
- ອອກ: ລຽບ, ບໍ່ມີສັນ
- ຈຸດສີເຫຼືອງຢູ່ເທິງອອກ, ຂາ ແລະ ຫົວ

ບັນຊີ


II



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

ຄ້າຂາຍເປັນ:
ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ · ອາຫານ

ອອງ




- ລວງຍາວອອງ: ຍາວເຖິງ 39 ຊມ
- ມີສັນສາມແຫ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນ
- ເຄື່ອງໝາຍສີດຳ ພ້ອມກັບສີສົ້ມ, ເຫຼືອງ, ຄຣົມ ຫຼື ຂາວ
- ສີຈາງລົງຕາມອາຍຸ, ສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະເປັນສີດຳ



ຟັກໄຂ່

ກະດອງເປັນແຂ້ວເລື້ອຍທີ່ດ້ານຫຼັງ (ໂດດເດັ່ນກວ່າເມື່ອຕອນຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ)



ຫ້ອງ



- ສີເຫຼືອງ ພ້ອມກັບການສາຍແສງສີເຂັ້ມ



ຟັກໄຂ່

ຫົວ


- ສີດຳ ພ້ອມກັບຈຸດສີເຫຼືອງທີ່ໂດດເດັ່ນ



ເຕົ້າຫວາຍ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Heosemys grandis</i>	ຊື່ສາມັນ Giant Asian Pond Turtle	📍 ກຳປູເຈຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ; ມຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
---	-------------------------------------	--

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



ອ້ອງ	- ໜຶ່ງໃນເຕົ້າອາຊີທີ່ຂອງແຂງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ - ກະດູກປູ້ທີ່ວັດດ້ານເທິງ - ເກັດ 5 ອັນທີ່ວັດດ້ານເທິງ - ຂອບເກັດເປັນແຂ້ວເລື້ອຍ ທີ່ດ້ານຫຼັງຂອງຂອງໃນສັດນ້ອຍ (ດ້ານຊ້າຍ: ຟັກໄຂ່; ດ້ານຂວາ: ຕອນຍັງນ້ອຍ)		
ທ້ອງ	- ລວດລາຍການແຜ່ໃນແຕ່ລະເກັດ - ຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງເກັດສອງຄູ່ເກືອບຊື່ - ບໍ່ມີຮອຍພັບ		
ຫົວ	ຫົວສີຂຽວເທົ່າ ເຖິງ ສີນ້ຳຕານກັບຈຸດສີເຫຼືອງ, ສີນ ຫຼື ປົວ, ມັກຈະຈາງຕາມອາຍຸ		
ຕີນ	- ດ້ານໜ້າ: ເລັບ 5 ອັນ - ດ້ານຫຼັງ: ເລັບ 4 ອັນ		



ຄ້າຍຄືກັນ:



ບັນຊີ
II *Notochelys platynota*
ເຕົ້າທັບທິນ



ບັນຊີ
II *Heosemys spinosa*
ເຕົ້າຈັກ



ບັນຊີ
II *Cycllemys* spp.
ເຕົ້າໃບໄມ້*

ອອງ

- ມັກມີເກັດ 6 – 7 ອັນທົ່ວດ້ານເທິງ
- ກະດູກປູຖືກລົບກວນໂດຍບໍລິເວນທີ່ແບນໃນທາງກາງ
- ດ້ານເທິງແບນ

- ມັກມີເກັດ 5 ອັນທົ່ວດ້ານເທິງ
- ກະດູກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເບົາກວ່າບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ
- ຂອບເກັດດ້ານໜ້າປີ້, ກາຍນາເປັນແຂ້ວເລື້ອຍທີ່ດ້ານຫຼັງ
- ເປັນວົງມົນ ພ້ອມກັບຂອບເກັດທີ່ເປັນແຂ້ວເລື້ອຍແຫຼມໃນ ສັດນ້ອຍ



- ມັກມີເກັດ 5 ອັນຕາມດ້ານເທິງ
- ກະດູກປີ້, ໂດດເດັ່ນໜ້ອຍລົງ ເມື່ອເປັນຜູ້ໃຫຍ່

ທ້ອງ


- ຮອຍພັບ



- ລວດລາຍການແຜ່ໃນແຕ່ລະເກັດ
- ບໍ່ມີຮອຍພັບ



- ຮອຍພັບ (ອາດຈະເຫັນຍາກໃນໂຕທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ)
- ຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງເກັດສອງຄູ່ເກືອບໂຄ້ງຢ່າງຫຼາຍ



ຕີນ

- ດ້ານໜ້າ: ເລັບ 5 ອັນ
- ດ້ານຫຼັງ: ເລັບ 4 ອັນ

- ດ້ານໜ້າ: ເລັບ 5 ອັນ
- ດ້ານຫຼັງ: ເລັບ 4 ອັນ

* ຕົວຢ່າງ *Cycllemys dentata* (ເຕົ້າໃບໄມ້ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້)



ຊະນິດພັນ ເຕົ້າຄຳ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Cuora</i> spp.	ຊື່ສາມັນ Asian Box Turtle spp.	ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໃຕ້
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການຄ້າຂາຍສັດປ່າຕົວຢ່າງລະຫວ່າງປະເທດໃນ:
Cuora aurocapitata (ເຕົ້າງົບຫຼຽນທອງ); *C. flavomarginata* (ເຕົ້າງົບຈີນ);
C. galbinifrons (ເຕົ້າງົບເຜິ້ງ); *C. mccordi* (ເຕົ້າງົບແມ່ກຄອດ); *C. mohouti* (ເຕົ້າສາມຫຼ່ຽມກ້າງ);
C. pani (ເຕົ້າງົບແຜນ); *C. trifasciata* (ເຕົ້າງົບລາຍໄມ້ຈີນ); *C. yunnanensis* (ເຕົ້າກອງຢຸນນານ);
C. zhoui (ເຕົ້າກອງຂອງໄຈ)



ບັນຊີ
| *Cuora bourreti*
ເຕົ້າງົບຂອງບູເຮັດ



ບັນຊີ
| *Cuora picturata*
ເຕົ້າງົບຫວຽດນາມໃຕ້

ໂຄງ ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ

ໂຄງ ຫວຽດນາມ

ອອງ

- ລວງຍາວ: 15 – 20 ຊມ
- ສີແດກຕ່າງກັນໄປ (ສີດຳ ເຖິງ ສີນ້ຳແກ່) ແລະ ລວດລາຍ (ມີ ຫຼື ບໍ່ມີແຖບ, ລາຍສີແຈດ)

- ລວງຍາວ: 15 – 20 ຊມ
- ສີສົ້ມເຫຼືອງ ເຖິງ ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມພ້ອມກັບສີຄຣົມ ລາຍສີຍື່ນອອກໄປແຕ່ລະຂ້າງເກັດ

ທ້ອງ

- ສີຄຣົມພ້ອມກັບດຸ່ນ ຫຼື ບໍ່ມີດຸ່ນ



- ສີຄຣົມ ພ້ອມກັບຈຸດສີດຳ ໃຫຍ່ເທິງເກັດແຕ່ລະອັນ



ຫົວ

- ແດກຕ່າງ (ສີດຳ, ແດງ, ສົ້ມ, ເຫຼືອງ, ບົວ, ຂາວ ແລະ ອື່ນໆ.)

- ສີຄຣົມ/ເຫຼືອງ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບຕາຂ່າຍສີເທົາລວດລາຍ



- ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:
- ອອງມີໂດນຄ່ອນຂ້າງສູງ
 - ຮອຍພິບເທິງອອງອະນຸຍາດໃຫ້ເຕົ້າປົດອອງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ
 - ຊອບຂອງອອງລຽບ (ບໍ່ເປັນແຂ້ວເລື້ອຍ)
 - ບໍ່ມີຮອຍບາກໃນຖານຂອງອອງ



ບັນຊີ

II

Cuora galbinifrons

ເຕົ້າງົບຜິ້ງ

📍

ຈີນ, ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ

- ລວງຍາວ: 15 – 20 ຊມ
- ສີດຳງາງ (ສີດຳ ເຖິງ ສີນ້ຳຕານ ແກ້) ແລະ ລວດລາຍ (ມີ/ບໍ່ມີ ແຖບ, ລາຍສີແດດ)



ບັນຊີ

II

Cuora trifasciata

ເຕົ້າຄຳ

📍

ຈີນ, ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 25 ຊມ
- ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມພ້ອມກັບແຖບສີດຳ າສາມ



ບັນຊີ

II

Cuora amboinensis

ເຕົ້າງົບດຳ

📍

ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ນາເລເຊຍ, ນີຽນມາ, ຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 25 ຊມ
- ສີຂຽວໝາກກອກ, ນ້ຳຕານ ຫຼື ເກືອບດຳ

- ດຳທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍ



- ແຕກຕ່າງ (ສີດຳ, ແດງ, ສັ້ມ, ເຫຼືອງ, ປົວ, ຂາວ ແລະ ອື່ນໆ.)

- ສີດຳພ້ອມກັບ ຂອບສີເຫຼືອງ



- ສີເຫຼືອງ ພ້ອມກັບເສັ້ນສີດຳ ແລະ ດຸ່ມສີນ້ຳຕານຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຕາ

- ສີເຫຼືອງ ຫຼື ຄຣົມ ພ້ອມກັບດຸ່ມສີດຳ ໜຶ່ງດຸ່ມຢູ່ເທິງ ເກັດແຕ່ລະ ອັນ



- ສີດຳ ພ້ອມກັບແຖບສີຂາວເຫຼືອງ

ເຕົ້າຫົວໃຫຍ່

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Platysternon megacephalum</i>	ຊື່ສາມັນ Big-headed Turtle	📍 ກຳປູເຈຍ; ຈີນ; ສປປ ລາວ; ມຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
--	-------------------------------	--

ບັນຊີ I ຂອງ CITES



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ບໍ່ຄ້າຍຄືກັບເຕົ້າໂຕອື່ນໃດໆ
- ຫົວໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະດຶງເຂົ້າໄປໃນອອງ, ຫຸ້ນດ້ວຍເກັດຮ່ວທີ່ໃຫຍ່
- ຫາງຍາວເກືອບເທົ່າກັບອອງ, ຫຸ້ນດ້ວຍເກັດໃຫຍ່



ໂຕໃຫຍ່



ໂຕຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ

ໂຕຍິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ເດັ່ນໄວ



ຊະນິດພັນ ເຕົາບິກຕະກູນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ Testudinidae spp.	ຊື່ສາມັນ Tortoise spp.	ອາພິກາ (ລວມທັງ ນາດາກາສະກາ); ອາເມລິກາ; ເອີຣົບ; ອາຊີ
-----------------------------------	---------------------------	--

ບັນຊີທັງໝົດ I/II ຂອງ CITES

11 ຊະນິດພັນ ຂຽນໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I



ບັນຊີ

Geochelone platynota
ເຕົາພະມ້າລາຍດາວ

ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ອ່ອງມັກຈະເປັນໂດນ, ແຂງ
- ການເກີດຊີ້ນວົງມົນແຕ່ລະປີເທິງເກັດມັກຈະຊັດເຈນ ແລະກຳນົດໄວ້ຢ່າງດີ
- ຕົນຫຼັງກວ້າງຄືຕົ້ມໄມ້ ຫຼື “ຕົນຊ້າງ”
- ສ່ວນຫຼາຍສາມາດຫິດຄໍ ແລະ ຂາທັງເຂົ້າໄປໃນອ່ອງກະດູກໄດ້
- ບາງສາຍພັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຕີບມີນ້ຳໜັກສູງເຖິງ 300 ກລ
- ຊະນິດພັນ Testudinidae ທັງໝົດອາໄສເທິງບົກ
- ຕົວຢ່າງທີ່ມີຊື່ວິດຕັ້ງໃຫ້ນ້ຳຈືດເພື່ອດື່ມ, ແຕ່ບໍ່ຄວນວາງໄວ້ໃນສະນ້ຳ ຫຼືນ້ຳເລິກ ເພາະພວກມັນອາດຈະຈິນ

ບັນຊີ I ຂອງ CITES:

- Astrochelys radiata* (ເຕົາລັງສີປະກາຍ)
- Astrochelys yniphora* (ເຕົາພະເລົາແຊ)
- Chelonoidis nigra* (ເຕົາຍັກກາລາປາໂກສ)
- Geochelone elegans* (ເຕົາອິນເດຍລາຍດາວ)
- Geochelone platynota* (ເຕົາພະມ້າລາຍດາວ)
- Geochelone platynota* (ເຕົາບິກຂອບເຫຼືອງ)
- Malacochersus tornieri* (ເຕົາແຜ່ນເຄັກ)
- Psammobates geometricus* (ເຕົາລາຍເລຂາຄະນິດ)
- Pyxis arachnoides* (ເຕົາແມງມຸນ)
- Pyxis planicauda* (ເຕົາຫາງແບ່ນ)
- Testudo kleinmanni* (ເຕົາໂດນອີຍິບ)

ຫິດຄໍ ແລະ ຂາ



ວົງການເຕີບໃດ



ຄ້າຍຄືກັບ:


ເຕົານ້ຳຈືດ

- ຕົນເປັດ



ເຕົາທະເລ

- ຕົນຄ້າຍຕົນກົບ



ຄ້າຂາຍເປັນ:

ແບບຍິ່ງມີຊີວິດ
ອາຫານ
ເຄື່ອງສະສົມ
ຢາ

ຊະນິດພັນ ເຕົ່າບິກຕະກູນ

- 1 ການຈັບຂອງ *Geochelone elegans* (ເຕົ່າອິນເດຍລາຍດາວ)
- 2 ອອງໃຊ້ໄວ້ເພື່ອເຮັດເຄື່ອງດື່ມຕົ້
- 3 ສັດຍິ່ງມີຊີວິດແມ່ນສໍາລັບການຄ້າຂາຍເປັນຊັ້ນ ແລະ ເປັນສັດລ້ຽງ
- 4 ການລ້ຽງ *Astrochelys yniphora* (ເຕົ່າພະເລົາແຊ) ທີ່ຍິ່ງມີຊີວິດ
- 5 ອອງ *Manouria impressa* (ເຕົ່າເດືອຍ)
- 6 ອອງ *Indotestudo elongata* (ເຕົ່າເພັກ)



1



2



6



3



5



4



ເຕົ່າດາວ

ບັນຊີ I ຂອງ CITES



ບັນຊີ


Geochelone elegans
ເຕົ່າອິນເດຍລາຍດາວ



ອິນເດຍ; ປາກົດສະຖານ, ສີລັງກາ

ອອງ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 38 ຊມ
- ອອງຮູບໄຂ່
- ດ້ານເທິງຂອງເກັດຈະເປັນມຸມທີ່ແຫຼມເນື້ອໃຫຍ່ຂຶ້ນ
- ລຳແສງສີເຫຼືອງຂອງລວດລາຍດາວຍືນອອກໄປທຸກທິດທາງ
- ເສັ້ນບໍລິບົດມາຈາກທາງກາງສະເໝີເຖິງຂອບຂອງເກັດ



ທ້ອງ

- ສີດຳ ພ້ອມກັບລຳແສງສີດຳ





ປັນຊີ | *Geochelone platynota*
ເຕົ້າພະມ້າລາຍດາວ

📍 ມຽນມາ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 30 ຊມ
- ເສັ້ນສືບຕໍ່ມາຈາກທາງກາງສະເໝີຂອງເກັດ
- ບໍ່ມີເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາງຂອງລວດລາຍດາວ




- ສີເຫຼືອງ ພ້ອມກັບຕຸ່ມສີ
ນ້ຳດານ-ຂຸ້ມ ຫຼື ດຳເທິງ
ແຕ່ລະເກັດ



ປັນຊີ | *Astrochelys radiata*
ເຕົ້າລິ້ງສີປະກາຍ

📍 ນາດາກາສະກາ; ແນະນຳສູ່ມໍລິສເດຍ; ການລນຕົວໃໝ່

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 40 ຊມ
- ໂດນຊິງສູງ ພ້ອມກັບທາງຂ້າງຫຼຸດລົງທັນທີ
- ລຳແສງສີເຫຼືອງຂອງຮູບແບບລວດລາຍດາວຄ້າຍຄື
ກັບພັດລົມປະມານໜຶ່ງສ່ວນສີຂອງເກັດ



- ພ້ອມກັບສາມຫຼ່ຽມສີດຳ



ເຕົ່າ ເພັກ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Indotestudo elongata</i>	ຊື່ສາມັນ Elongated Tortoise	📍 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກຳປູເຈຍ; ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ; ນຽນນາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
---	--------------------------------	---

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



ບັນຊີ II
Indotestudo elongata
ເຕົ່າ ເພັກ

ອອງ

- ເຄື່ອງໝາຍປ່ຽນແປງ (ພື້ນຫຼັງ ສີສົ້ມ ຫາ ສີຂຽວ)
- ອາດຈະມີເຄື່ອງໝາຍສີດຳທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ



ຫ້ອງ

- ສີຄຣົມ ເຖິງ ສີເຫຼືອງຂຽວພໍສົນຄວນ ເຄື່ອງໝາຍສີເຂັ້ມຂະໜານນ້ອຍ ແລະ ກະຈັດກະຈາຍ (ອາດຈະຈາກລົງເມື່ອສັດ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ)





ຫົວ

- ສີເຫຼືອງ
- ໂຕຜູ້ຈະສະແດງສີບົວຮອບດ້ວງຕາ ແລະ ຮູດັງໃນຊ່ວງລະດູປະສົມພັນ



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ສ່ວນຫຼາຍມີເກັດຢູ່ດ້ານຄໍທີ່ແຄບ, ຍາວ ແລະ ນ້ອຍ (ທີ່ທາງກາງຂອງດ້ານໜ້າຂອງເກັດ)
- ຈຸດສູງສຸດ ເມື່ອເບິ່ງຈາກດ້ານທີ່ຢູ່ເກັດທີ່ສາມທ້ວດ້ານເທິງ



ຄ້າຍຄືກັນ:



☉ ອິນໄດເນເຊຍ



☉ ອິນເດຍ

- ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີເກັດຢູ່ດ້ານຄໍ, ສັ້ນ ແລະ ເປັນລົ້ມຮູບຮ່າງເມື່ອນ້ຳເໝີ
- ຈຸດສູງສຸດຂອງກະດອງແມ່ນຢູ່ເທິງເກັດທີ່ສາມ
- ສີເຫຼືອງໝາກນາວ, ເຄື່ອງໝາຍສີຫຼຽມສີດຳໃຫຍ່ຢູ່ທາງກາງຂອງເກັດ
- ເຄື່ອງໝາຍສີດຳເຂັ້ມເທິງທ້ອງ (ບໍ່ມີດຄົ້ນຫຼື ແຍກສ່ວນ)

- ຈຸດສູງສຸດຂອງກະດອງສ່ວນຫຼາຍມັກຢູ່ເທິງທີ່ສອງ ເກັດ (ອາດຈະຢູ່ທີ່ສາມສຳລັບໂຕນ້ອຍ)
- ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີເກັດຢູ່ຄໍ
- ເຄືອຍຮູບກວມຢູ່ທີ່ສິ້ນຂອງຫາງ



ເຕົ້າຍ໌ກອາຊີ & ເຕົ້າເດີອຍ

ຊື່ວິທະຍາສາດ <i>Manouria emys</i>	ຊື່ສາມັນ Asian Giant Tortoise	ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ອິນໂດເນເຊຍ; ມາເລເຊຍ; ນຽນນາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
--------------------------------------	----------------------------------	--

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາເຕົ້າຍ໌ກຂອງອາຊີ (ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 60 ຊມ)
- ອອງ ແລະ ຫ້ອງສີດຽວກັນ — ເທົາ, ນ້ຳຕານ ຫຼື ດຳ
- ເກັດຢູ່ດ້ານເທິງຂອງອອງແບນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອ້າເຂົ້າ
- ຫົວສີນ້ຳຕານ ຫຼື ດຳ

ຍາວເຖິງ 60 ຊມ




Scientific name <i>Manouria impressa</i>	Common name Impressed Tortoise	📍 ສປປ ລາວ; ນາເລເຊຍ; ນຽນມາ; ໄທ; ຫວຽດນາມ
---	-----------------------------------	---

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II ຂອງ CITES



ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ:

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 31 ຊມ
- ອອງສີນ້ຳຕານທອງ ພ້ອມກັບຂອບດຳເຖິງເກັດ
- ເກັດຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານຂ້າງຂອງອ້າເຂົ້າ
- ຂອບຂອງອ້າເປັນແຂ້ວເລື້ອຍ ແລະ ຄວ້າ
- ທ້ອງເປັນສີເຫຼືອງ
- ຫົວເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ແດງ ກັບສີນ້ຳຕານ ເກັດຢູ່ດ້ານຂ້າງ ແລະ ດ້ານຫຼັງ



ເຕົ້າອອງອ່ອນ

ບັນຊີ II ຂອງ CITES



Amyda cartilaginea
ປາຜາອອງອອງອາຊີ

📍 ບຣູໄນ ດາຣູຊາລານ; ກຳປູເຈຍ; ອິນໂດເນເຊຍ; ສປປ ລາວ; ມາເລເຊຍ; ມຽນມາ; ສິງກະໂປ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

ອອງ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 80 ຊມ
- ຮູບຮ່າງເປັນວົງມົນ

ຂອບດ້ານໜ້າ*

- ເນື້ອຫຍາບ ພ້ອມກັບຊຸມນ້ອຍ (ດຸ່ມ)

* ໝາຍເຫດ:

ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຊັດເຈນຫຼາຍຢູ່ເທິງຂອບ
ດ້ານໜ້າຂອງອອງ



ຫົວ

- ຈຸດສີເຫຼືອງຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ ຄໍ
- ດິ່ງແມ່ນຄ້າຍຄືລຳໂຕ ແລະ ຊື່ຫຼາຍ



ໜຸ່ມ

- ທ້ອງສີຂາວ ຫຼື ສີເທົາ





ປັນຊີ
II

Dogania subplana
ປາຝາຫົວໃຫຍ່

📍 ອິນເດຍເຊຍ; ນາເລເຊຍ; ນຽນນາ; ຟີລິບປິນ; ສິງກະໂປ



ປັນອນໃນ
ປັນຊີ CITES

Pelodiscus sinensis
ປາຝາຈີນ

📍 ຈີນ; ຍີ່ປຸ່ນ; ໄຕ້ຫວັນ; ຫວຽດນາມ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 35 ຊມ
- ແບນ ແລະ ຄ່ອນຂ້າງລຽບ
- ແຖບສີຂຽວໂປຮອດທາງກາງ

- ລວງຍາວ: ຍາວເຖິງ 35 ຊມ
- ນົກເປັນຮ່ອງ
- ອາດຈະມີເຄື່ອງໝາຍສີດຳທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ

- ລຽບໂດຍບໍ່ມີເນື້ອຫຍາບ



- ໜຶ່ງດຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງ



- ດັງແມ່ນຄ້າຍຄືລຳໂຕ ແລະ ປົນລົງ



- ດັງຍາວເນື້ອ ປຽບທຽບກັບເຕົ້າທີ່ ອອງອອນທີ່ສຸດ



- ທ້ອງສີຂາວ ເຖິງ ສີນ້ຳຕານສົ້ມ

- ແດງ/ສົ້ມ (ອາດເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ ແຕ່ ກັບຈຸດດຳສະເໝີ ຢູ່ຂາດ້ານຫຼັງ ແລະ ທ້ອງ)

ການຮັບຮູ້

ຜູ້ຂຽນຂໍຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຂອງອົງການ TRAFFIC ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສໍາລັບເວລາ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຄູ່ມືນີ້ຂຶ້ນມາ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈມາຍັງ James Eaton, Jordi Janssen, Vincent Nijman, Chris R. Shepherd, Emerson Sy ແລະ Richard Thomas ທີ່ຊ່ວຍກວດແກ້. ຊ່າງພາບຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກຮູບພາບຂອງພວກເຂົາເພື່ອລວມຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາກໍເປັນຕາຊື່ນຊົມຢ່າງຍິ່ງ.

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ກົມປາບປາມຢາເສບຕິດສາກົນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (INL) ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ.

ເຄດິດຮູບພາບ

ເຄດິດຮູບພາບຖືກລະບຸຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ຫາ ຂວາ, ດ້ານເທິງ ຫາ ລຸ່ມສູດໃນໜ້າຕ່າງໆ ທີ່ຮູບພາບບໍ່ໄດ້ນັບ. ສໍາລັບຮູບຕ່າງໆທີ່ນັບ, ຮູບເຫຼົ່ານີ້ປາກົດຕາມລຳດັບ.

ຫຼັງປົກຮູບພາບຕ່າງໆ ©Urs Woy/WWF; ©James Warwick/WWF-US; ©Muhammad Alzahri; ©Tom Vierus/WWF-US; ©Victoryakht/Dreamstime.com; ©Andrew Buchanan/Unsplash

ໜ້າ XI ©Australian Border Force; ©Australian Border Force; ©Matthew Pritchett; ©P. Tansom/TRAFFIC; ©Royal Thai Customs; ©FLIGHT

ໜ້າ XII ©Australian Border Force; ©U.S. Customs Border Protection; ©Australian Border Force; ©Australian Border Force

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

ໜ້າ 2 ພາບທັງໝົດ ©Satit Srihin/Dreamstime.com

ໜ້າ 3 ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Steven Lim/Wildlife Conservation Reserves; ©TRAFFIC

ໜ້າ 4 ©Victoryakht/Dreamstime.com; ©TRAFFIC

ໜ້າ 5 ພາບທັງໝົດ ©TRAFFIC

ໜ້າ 6-7 ດິນສະບັບ ແລະ ອອກແບບຄືນມາຈາກ ©Environment and Climate Change Canada, 2003

ໜ້າ 8 ©Souvik Kundu/WWF; ©Martin Harvey/WWF

ໜ້າ 9 ©Tim Lawlor; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Tim Lawlor; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC

ໜ້າ 10-11 ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC

- ໜ້າ 12 ©Gerald S. Cubitt/WWF; ©Sanchez & Lopez/WWF; ©Claire Beastall;
©Annette Olsson/CI Cambodia; ©Annette Olsson/CI Cambodia
- ໜ້າ 13 ©TRAFFIC; ©Annette Olsson/CI Cambodia; ©Annette Olsson/CI Cambodia;
©Lalita Gomez/TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC
- ໜ້າ 14 ©Jesada Sabai/Shutterstock.com; ©Claire Beastall;
ຖືກອອກແບບຄືນມາຈາກ ©Environment and Climate Change Canada, 2003
- ໜ້າ 15 ©C. Yeong/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Mei Hsui Hwang;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 16 ©Richard Edwards/WWF-UK
- ໜ້າ 17 ພາບທັງໝົດ ©TRAFFIC
- ໜ້າ 18 ©Roland Seitre/WWF/naturepl.com; ©S.Y. Chin/TRAFFIC;
©imageBROKER/Alamy Stock Photo
- ໜ້າ 19 ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC;
©TRAFFIC; ©James Compton/TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 20 ©Anup Shah/WWF/naturepl.com; ©Martin Harvey/WWF; ©GreenViet;
©Le Khac Quyet; ©Mikaaail Kavanagh/WWF
- ໜ້າ 21 ©TRAFFIC; ©Claire Beastall; ©GreenViet; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC
- ໜ້າ 22 ©Ola Jennersten/WWF; ©Jason Rose
- ໜ້າ 23 ©TRAFFIC; ©U.S. Fish and Wildlife
- ໜ້າ 24 ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©TRAFFIC

ນິກ

- ໜ້າ 28 ©Muhammad Alzahri Darus; ©Jason Teo
- ໜ້າ 29 ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC
- ໜ້າ 30 ©Ayuwat Jearwattananok; ©Ayuwat Jearwattananok;
©Ayuwat Jearwattananok; ©Nick Baker/EcologyAsia;
©Ayuwat Jearwattananok; ©Ayuwat Jearwattananok
- ໜ້າ 31 ©Gabriel Low; ©TRAFFIC; ©James Eaton/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 32 ©Ayuwat Jearwattananok; ©Jason Teo; ©Ayuwat Jearwattananok;
©Ayuwat Jearwattananok; ©Ayuwat Jearwattananok; ©Ayuwat Jearwattananok
- ໜ້າ 33 ©Heru Cahyono/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 34 ©Diane Tallo; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Martin Harvey/WWF

- ໜ້າ 35 ©Jan Lile; ©James Eaton; ©Stan Jarzynski; ©Jess Lee/WRS; ©Nick Baker/EcologyAsia;
©Jess Lee/WRS; ©Sandeep Gangadharan; ©Muhammad Iqbal
- ໜ້າ 36 ©Ayuwat Jearwattanakanok; ©Lean Yen Loong
- ໜ້າ 37 ©Lee Kip Yang; ©Suppalak Klabdee; ©Suppalak Klabdee; ©John Steed

ສັດເລືອຄານ

- ໜ້າ 40 ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Ingo Arndt naturepl.com/WWF; ©David Lawson/WWF-UK
- ໜ້າ 41 ©Meg Gawler/WWF; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 42 ©Kadellar; ©Claire Beastall; ©Klaus Rudloff/BioLib
- ໜ້າ 43 ©TRAFFIC; ©Claire Beastall; ©James Compton/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC;
©Mark Auliya/TRAFFIC
- ໜ້າ 44 ©Gary Stephenson; ©Claire Beastall; ©Frank Canon; ©U.S. Fish and Wildlife
- ໜ້າ 45 ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC;
©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Ron Lilley; ©Mark Auliya/TRAFFIC
- ໜ້າ 46 ©Ron Lilley; ©Ron Lilley; ©Thai National Parks; ©Martin Harvey/WWF;
©Martin Harvey/WWF; ©Mark Auliya; ©Mark Auliya
- ໜ້າ 47 ©TRAFFIC; ©James Compton/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 48 ©Jurgen Freund/WWF; ©Meg Gawler/WWF; ©Jurgen Freund/WWF;
©Doug Perrine/WWF; ©Jason Isley/scubazoo.com
- ໜ້າ 49 ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©James Compton/TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 50 ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC;
©David Tan/Wildlife Reserves Singapore; ©Vienna Zoo; ©Chan Eng Heng
- ໜ້າ 51 ©Rick Hudson; ©David Tan/Wildlife Reserves Singapore;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Brian Horne
- ໜ້າ 52 ©Kadoorie Farm Botanical Gardens; ©Olivier Cailabet
- ໜ້າ 53 ©Turtle Conservancy; ©Peter Praschag; ©Peter Paul van Dijk;
©Turtle Conservancy; ©Peter Paul van Dijk; ©Peter Paul van Dijk
- ໜ້າ 54 ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe;
©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe
- ໜ້າ 55 ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe; ©Sabine Schoppe;
©Sabine Schoppe; ©Mark Auliya; ©Sabine Schoppe
- ໜ້າ 56 ©Nguyen Thu Thuy-R/ATP; ©Hoang Van Ha-R/ATP; ©Torsten Blanck; ©Torsten Blanck
- ໜ້າ 57 ©Timothy McCormack/ATP; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC;
©Torsten Blanck; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Dionysius Shama

- ໜ້າ 58 ພາບທັງໝົດ ©Peter Paul van Dijk
- ໜ້າ 59 ພາບທັງໝົດ ©Peter Paul van Dijk
- ໜ້າ 60 ©Kalyar Platt; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Mark Auliya/TRAFFIC;
©Mark Auliya/TRAFFIC; ©Jurgen Freund/WWF
- ໜ້າ 61 ©Philippine Bureau of Customs - EPCD; ©Hartmut Jungius/WWF; ©TRAFFIC;
©P. Tansom/TRAFFIC; ©TRAFFIC; ©TRAFFIC
- ໜ້າ 62 ©K. Selvaganesh; ©Jacob Jose; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC
- ໜ້າ 63 ©David Tan/Wildlife Reserves Singapore; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC;
©James Compton/TRAFFIC; ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Jerome Maran;
©Chris R. Shepherd/TRAFFIC
- ໜ້າ 64 ©Indraneil Das; ©Sabine Schoppe; ©Peter Paul van Dijk; ©Bernard Dupont
- ໜ້າ 65 ©Peter Paul van Dijk; ©Peter Paul van Dijk; ©Klaus Rudloff/BioLib;
©S.U Saravana Kumar; ©Ivan Ives
- ໜ້າ 66 ©Klaus Rudloff/BioLib; ©Mark Auliya/TRAFFIC
- ໜ້າ 67 ພາບທັງໝົດ ©Douglas B. Hendrie
- ໜ້າ 68 ພາບທັງໝົດ ©Mark Auliya
- ໜ້າ 69 ©Chris R. Shepherd/TRAFFIC; ©Mark Auliya; ©Paul Hein; ©Bui Dang Phong;
©Bui Dang Phong; ©Mark Auliya/TRAFFIC

ການມີຊີວິດຢູ່ລອດ
ຂອງສັດປ່າເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານ

WWW.TRAFFIC.ORG



ຂອງຂວັນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ